

DANMARKS STATISTIK
STATISTISKE MEDDELELSER
FJERDE RÆKKE NITTENDE BIND
ANDET HÆFTE
COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4^{ME} SÉRIE TOME 19 2^{ME} LIVRAISON




HØSTENS UDFALD I DANMARK 1905

FORELØBIG REDEGØRELSE

CARACTÈRE DE LA RÉCOLTE EN DANEMARK 1905

UDGIVET AF STATENS STATISTISKE BUREAU
PUBLIÉ PAR LE BUREAU DE STATISTIQUE DE L'ÉTAT



KØBENHAVN
BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI
1905

Udgivet i November 1905.

Som sædvanlig har Bureauet gennem Amterne indhentet Oplysninger om Aarets Høstudbytte, saaledes som dette frembyder sig for et foreløbigt Skøn. Det har i Aar været forbundet med større Vanskeligheder end ellers at afgive dette, idet Forskellighederne selv inden for ret begrænsede Territorier have været meget betydelige. Hertil have ikke mindst Larveangrebene medvirket; af Hensyn til den omfattende Skade, disse have foraarsaget, har man fundet det nødvendigt at indsamle de særlige Oplysninger herom, som i skematisk Form meddeles Side 24—29.

Forinden man gaar over til at give den nærmere Karakteristik af de enkelte Afgrøder og meddele de specielle Forhold vedrørende disse, skal man, ligesom i de foregaaende Aar, give en paa Grundlag af Maanedsoversigter fra Meteorologisk Institut samt Beretninger i landøkonomiske Blade og Tidsskrifter udarbejdet Fremstilling af Landbrugsaarets Vejrforhold og disses Indvirkning paa de forskellige Afgrøder.

Efteraaaret 1904 var meget mildt. Temperaturen i Oktober var vel normal som Helhed, men Novembers Middelvarmegrad laa fra $0,6^{\circ}$ C. til $0,8^{\circ}$ C. over den normale, henholdsvis i København og Tarm, medens Temperaturen i December endog laa $2,1^{\circ}$ C. over Normalen i København og $2,6^{\circ}$ C. derover i Tarm. December var saaledes ualmindelig mild, dog sluttede Maaneden med en pludselig indtrædende og betydelig Afkøling indtil -10° C. I øvrigt havde Efteraarsmaanederne ikke Frostperioder af Betydning.

Nedbøren i de omtalte tre Maaneder var ret normal og fordelte sig som Helhed nogenlunde ligeligt over alle Landsdele. Dog var Regnmængden i Oktober ringe i mange Egne, hvilket følte des mere, fordi de forudgaaende fire Maaneder havde været

ualmindelig regnfattige. I Øernes Amter laa Yderpunkterne for Nedbøren i Oktober—December Maaneder i Holbæk Amt: 168^{mm} og Svendborg Amt: 190^{mm}, medens disse Amters gennemsnitlige Nedbør i de paagældende Maaneder, beregnet efter 25 Aars Erfaring, er henholdsvis 156^{mm} og 196^{mm}. I Jylland faldt den mindste Nedbør i Viborg Amt, nemlig 163^{mm} (mod normalt 174^{mm}) og den største i Vejle Amt, 202^{mm} (mod normalt 195^{mm}). Landets Nedbørsforhold paa denne Aarstid karakteriseres ellers ved en stigende Regnmængde fra Øst til Vest, saaledes at Thisted, Ringkøbing og Ribe Amter faar rigeligst og det østlige Sjælland mindst.

For Efteraarsarbejdernes Udførelse, der kunde begynde i god Tid paa Grund af den tidligt tilendebragte Høst, var Vejrliget i Efteraarsmaanederne saaledes ualmindelig gunstigt, ligesom Vækstbetingelserne for Vintersæden og den unge Kløver vare særdeles gode. Disse gunstige Forhold kom dog fortrinsvis de lettere Jorder til Gode, medens der fra mange af de Egne, hvor der findes stærkt lerede Jordbundsforhold, længe klagedes over, at det var vanskeligt at faa Vintersæden lagt rettidigt, og over at Jorden i det hele taget var for fast, saa at Roernes Optagning og Jordens Behandling var besværlig. Det maa jo nemlig erindres, at Sommer- og Høstmaanederne havde været meget regnfattige, idet Nedbøren i Juni—September kun var halvt saa stor som den sædvanlige, nemlig 134^{mm} mod 258^{mm}. I de stærkt lerede Egne tog det derfor Tid, inden Jordbundens normale Fugtighedsforhold blev genoprettet, og endnu i Midten af November blev der fra alle Egne klaget over Vandmangel.

Mod Aarets Slutning lød alle Beretninger paa, at Jordbehandlingen var endt, og at Vintersæden stod grøn og ventelig modstandsdygtig over for Vinteren.

Den ved Aarsskiftet indtraadte Temperaturnedgang var kortvarig, og uagtet Termometret i Januar Maanedes første Dage viste indtil -18° C., hvilken Frostperiode senere, efter Maanedens Midte, efterfulgtes af en anden, noget længere, hvor Temperaturen

gik ned til ca. $\div 10^{\circ}$ C., var Maanedens Middelvarmegrad dog $0,3^{\circ}$ C. over Normalen paa Landbohøjskolen og $0,7^{\circ}$ C. derover i Tarm. Februar havde kun 3 Dage under Normalen; Middelvarmen var i København 1° C. og i Tarm $1,8^{\circ}$ C. over Maanedens sædvanlige. Marts var ligeledes meget mild, fraset Maanedens første Dage, da Temperaturen gik ned indtil $\div 10^{\circ}$ C. Middelvarmen var i København $1,6^{\circ}$ og i Tarm $1,9^{\circ}$ C. over den normale.

Nedbøren var under den sædvanlige i Januar og Februar, hvorimod den i Marts var betydelig over Normalen (33^{mm}); paa de østlige Øer var Nedslaget dog ikke væsentlig større end det almindelige, hvorimod Vejle og Ribø Amter fik henholdsvis 77^{mm} og 78^{mm} . Snelaget var uden Betydning i Vinterperioden, kun i Midten af Januar og de første Dage af Februar var Jorden snedækket, lokalt i Vendsyssel desuden i den første Uge af Marts.

Det milde Vejr vedvarede ikke i April; denne Maanedes Temperatur var i København $1,9^{\circ}$ C. og i Tarm $1,6^{\circ}$ C. under Maanedens sædvanlige Varmegrad med kun faa Dage, der laa over den. Særlig kolde Dage indtraf fra den 7. til den 10. med $\div 7^{\circ}$ C. i Nordjylland og $\div 8^{\circ}$ C. i Vestjylland, og fra den 6. til den 28. var Temperaturen uafbrudt under Normalen.

I April var Nedbøren ligesom i Marts betydelig. Maanedens normale Nedbør blev overskreden i alle Egne, mindst i Holbæk Amt (36^{mm} mod 24^{mm}), mest i Randers Amt (73^{mm} mod 30^{mm}). I Dagene fra 2.—11. indtraf et Snefald, der var usædvanlig stærkt efter Aarstiden, saa at Jorden i disse Dage var snedækket i kortere eller længere Tid.

Det milde Vejr i Vintermaanederne var ikke et saa ubetinget Gode for Landbruget, som det var i det forudgaaende Aar. Markarbejderne vare nemlig afsluttede inden Vinterens Komme; Rugen havde mange Steder udviklet sig frodigere, end man ansaa for ønskeligt, hvorfor en længere Frostperiode med et lille skærmende Snedække mentes at ville være det mest heldige; Hveden og de nyudlagte Kløvermarker havde vel nok Trang til en fortsat Udviklingsperiode, men her vare de ret hyppige Temperaturvekslinger mellem Tø og Frost ikke gavnlige, selv om Temperaturen

Nedgang under Frysepunktet kun faa Gange var af nogen Betydning og som oftest af kort Varighed.

Vinterberetningerne lyde i Overensstemmelse hermed. I Begyndelsen af Januar, men efter Vinterens strængeste Frostperiode, hed det: «Vintersæden staar fremdeles godt»; men allerede henimod Maanedens Slutning begyndte man at blive noget betænkelig for Hveden, og i Begyndelsen af Februar omfattede Bekymringerne tillige den unge Kløver. I Slutningen af Marts lød Beretningerne om Hvedens Tilstand modsigende; ikke faa Udtalelser gik ud paa, at Hvedemarken maatte ompløjes.

Markarbejdet laa stille i Vinterens første Del; hen i Februar begyndte man, lokket af Jordens bekvemme Tilstand og det foraarsagtige Vejr, at udkøre Gødning og sætte Plovene i Gang, og i Slutningen af Marts forlød det fra forskellige Egne, at der var saaet Bælgsæd.

Det milde Vejr holdt sig til de første Dage af April; det hed sig da, at det foraarsagtige Vejrlig havde sat Liv i Vintersæd og Græs, men at Markarbejderne maatte standses som Følge af for megen Væde. Man havde ventet et tidligt Foraar og ønsket en tidlig Foraarssaaning, fordi der kun var ringe Fugtighed i Undergrunden; inden Midten af April var man dog klar over, at slige Forhaabninger vare beskæmmede, thi alt Markarbejde laa stille paa Grund af vedvarende Regn og Kulde. Endnu 25. April hed det, at Vejret nærmest var vinterligt, og at Saaningen ingen Fremskridt havde gjort.

Medens Middelterperaturen for Landet som Helhed i Maj—Juli Maaneder var betydelig over den normale, var Middelvarmen i August en Ubetydelighed under Normalen. For den nordligste og sydligste Del af Landet (henholdsvis Hjørring og Orebygaard) faldt alle 4 Maaneders Middelterperatur i Aar sammen med Gennemsnittet for 40 Aar.

I Sommeren 1905 var Temperaturen som Helhed over Normalen, hvilket fremgaar af omstaaende Oversigt (Side 7).

Middelvarmen i ° C. paa forskellige Stationer i Maj, Juni, Juli og August 1905 og efter 40 Aars Iagttagelser.

	Maj		Juni		Juli		August		Maj—August	
	1905	Normalen	1905	Normalen	1905	Normalen	1905	Normalen	1905	Normalen
Hjørring	9,5	9,5	14,0	14,0	15,4	15,4	15,0	15,0	13,5	13,5
Herning	11,5	9,8	16,5	14,0	17,5	15,2	15,2	14,8	15,2	13,5
Ryslinge	11,6	10,0	15,8	14,1	16,5	15,7	15,3	15,2	14,8	13,8
Landbohøjsk. .	11,9	10,6	17,1	15,2	17,6	16,7	15,9	16,0	15,6	14,6
Orebygaard . .	11,1	11,1	15,2	15,2	17,1	17,1	16,4	16,4	15,0	15,0
Danmark	11,5	10,2	16,3	14,5	17,0	16,0	15,5	15,6	15,1	14,1

Nedbøren var kun ringe i Maj; Maanedens normale Regnmængde 40^{mm} eller noget derover fik de fynske Amter og Lolland-Falster samt Aalborg og Hjørring Amter, medens det øvrige Land fik under Normalen, Københavns og Frederiksborg Amter endog kun ca. 14^{mm}. Juni, Juli og August Maaneders Nedbør fremgaar af omstaaende Oversigt (Side 8), hvoraf det vil ses, at Regnmængden fordelte sig meget forskelligt over Landsdelene. I Juni, hvor en rigelig Nedbør er af størst Værdi, fik Præstø Amt, Bornholm og Viborg Amt under Halvdelen af Københavns og Odense Amter; i Juli fik Bornholm 108^{mm}, Thisted Amt kun 21^{mm}. I August var Nedbøren meget stor; paa Bornholm var den saaledes større end nogen tidligere observeret Regnmængde i August. Regnen faldt for Størsteparten i Maanedens sidste Halvdel, hvorved den vanskeliggjorde Høsten i høj Grad.

I September vedvarede det regnfulde Vejr indtil Maanedens sidste Dage, Middelttemperaturen var under Normalen, idet navnlig Nætterne vare kolde. Nedbøren, der normalt er 70^{mm} til 90^{mm}, voksende fra Øst til Vest, var stor i Maanedens Begyndelse, men for hele Maaneden blev Normalen kun overskreden i Holbæk Amt, paa Lolland-Falster og i Sydøstjylland, medens Sydsjælland og den nordlige Halvdel af Jylland fik under Normalen.

Oversigt over Nedbøren i Juni, Juli og August.

Nedbøren i	1905				Juni—August tilsammen		
	June	Juli	August	Til- sam- men	1904	1908	1861—85
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
Københavns Amt.	60,0	60,9	144,4	265,3	91,1	215,0	185
Frederiksborg —	65,0	61,2	129,0	255,2	96,9	231,2	190
Holbæk —	55,6	50,6	121,7	227,9	98,8	236,3	168
Sorø —	45,1	69,5	103,2	217,8	111,5	229,4	175
Præstø —	25,3	76,0	108,3	209,6	104,6	143,0	181
Bornholms —	26,9	108,4	142,0	277,3	85,9	120,9	161
Maribo —	36,9	75,4	77,1	189,4	118,6	200,9	168
Svendborg —	53,1	50,3	106,0	209,4	122,6	272,6	200
Odense —	68,3	55,5	95,5	219,3	101,4	239,9	183
Vejle —	53,1	59,3	120,5	232,9	122,9	262,9	204
Aarhus —	36,8	51,2	133,4	221,4	135,7	245,7	200
Randers —	35,9	39,2	128,6	203,7	127,4	187,1	187
Aalborg —	43,5	29,4	145,3	218,2	101,4	178,5	184
Hjørring —	49,1	34,6	130,6	214,3	101,2	314,6	179
Thisted —	34,5	20,7	133,3	188,5	84,0	192,0	201
Viborg —	29,9	46,0	111,8	187,7	114,9	211,4	189
Ringkøbing —	48,9	37,7	120,3	206,9	133,5	213,6	203
Ribe —	51,1	63,0	112,1	226,2	110,1	251,8	210
Gennemsn. f. hele Landet	45	55	109	209	111	222	183
Middelnedbør for hele Landet efter lagttagelserne 1861—85 . . .	47	66	70	183	—	—	—

Med Maj Maanedes Begyndelse indtraadte en Temperaturstigning og mere grødefuldt Vejr. Der blev derfor stor Travlhed med Markarbejdet i alle Egne, og fra de sydlige Øer og Sydsjælland indløb de første Beretninger om Saaningens Afslutning i Maanedens første Dage; i de Egne, hvor den foregaar senere, blev den sinket en Del af Nattefrost, saa at Kornsaaningen først kunde siges at være afsluttet efter Midten af Maj Maaned; den faldt mere enstidig end ellers, sent for de tidlige Egenes Vedkommende, normalt for de sildigere Egne. Alle Beretninger lød paa, at Jorden var falden ualmindelig godt for Redskaberne.

I Slutningen af Maj begyndte Klager at indløbe over manglende Regn, hermed fortsattes i Juni og senere; men efter Midten af

Juni lød Klagerne mere lokalt, særlig fra Egnene nord for Limfjorden og fra Midtjylland.

Betingelserne for Afgrødernes Udvikling i Vækstmaanederne vare mere forskelligartede end sædvanlig. Saaledes hed det fra nogle Egne, at man ikke mindedes saa gunstige Vækstbetingelser som denne Sommers, medens slige Udtalelser mødte stærke og velbegrundede Protester fra mindre heldigt stillede Egne. Overalt var man dog enig om, at samtlige Afgrøder spirede hurtigt, og at den første Udvikling var lovende. Derefter gjorde den forskelligt faldende Nedbør sig gældende, og end mere de for dette Høstaar karakteristiske Larveangreb; tilmed faldt begge disse Aarsager som oftest sammen, saa at Virkningen blev des større.

Kornhøsten begyndte ved normal Tid. Den 1. August hed det, at Mejningen af Rug og 6rd. Byg var i fuld Gang, samt at en Del var hjemkørt, og 8. August, at disse to Afgrøder overalt vare bragte i Hus. 15. August kunde enkelte mindre Avlsbrug melde «alt indhøstet»; men straks derefter begyndte August Maanedes Regnperiode med svære Regnskyl, saa at Høsten derefter faldt lige saa besværlig som Begyndelsen var foregaaet let. I September fortsattes det regnfulde Vejr, hvoraf Følgen var, at Høstarbejdet ofte laa stille i lang Tid, kun med faa Dages Ophold, hvori mere eller mindre medtaget Korn kunde indbjerges. Først omkring den 26. September kunde det siges, at Høsten var endt, omtrent samtidig i alle Egne.

Af alle Kornafgrøder har Rugen uden Tvivl haft de bedste Betingelser. Den blev tidligt saaet og udviklede sig godt i det milde Efteraar. Da den vedblev at vokse Vinteren igennem, var man ofte mod Foraarstid bange for, at den var altfor frodigt udviklet, en Bekymring som blev bekræftet hen paa Forsommeren, da Rugen mange Steder blev slaaget stærkt ned af Tordenbygerne. Den stod i fuld Blomstring 13. Juni, og 4. Juli hed det, at Aksene vare store og brede; den havde atter rejst sig, hvor den var slaaget ned. Som alt sagt, faldt Rughøsten inden Sommerens stærke Regnperiode, hvorfor denne Sædart indbjergedes i fortrinlig Stand. — Hveden havde mindre gode Betingelser. Den var ofte saaet

noget sent, eller spirede mindre tilfredsstillende, fordi de sværeste Hvedejorder vare for udtørrede i Efteraaret 1904; dog udtalte Beretningerne sig ret lovende om Hvedens Chancer for at gaa Vinteren igennem. Indtil 10. Januar løde Beretningerne paa, at Vintersæden fremdeles stod godt; men herefter forekommer der hyppigt Betæneligheder over Hvedens Udseende. De bleve begrundede i ret hyppige Vejrforandringer. Paa den ene Side var Temperaturen nok højere end normalt, men der var ofte Afbrydelser med ikke lidt lavere Temperaturer og med Nattefrost. Dog hed det 28. Februar, at Hvedens Udseende vel var «noget vissent, men uden at den har taget væsentlig Skade». 28. Marts hedder det herom, at Beretningerne ere modsigende og at enkelte Hvedemarker maa ompløjes. 9. Maj hed det, at Hveden havde rettet sig; men i Maanedens Slutning var man dog almindeligvis paa det rene med, at Hvedehøsten ikke vilde blive overvættens stor. Hvedehøsten faldt paa Grænsen af den gode Høstperiodes Slutning og Regntidens Begyndelse; om Udbyttet indberettedes, at det kun fyldte lidt. — Vaarsæden spirede hurtigt og fyldigt; om dens senere Udvikling er det allerede sagt, at Vilkaarerne vare meget uensartede. I de Egne, der have været haardest angrebne af Larver, vil Udbyttet navnlig af Havre kun have været meget ringe. Hertil kommer, at en meget stor Del af Vaarsæden blev indbjerget i Slutningen af August og i September under den lange Regntid, som forringede Udbyttet og navnlig Kvaliteten ret betydeligt. — Rodfrugterne har i den forløbne Sommer haft ualmindelig gode Betingelser; Saatiden faldt ret normalt, Jorden havde tilstrækkelig Fugtighed, saa at der mod Sædvane kun lød ubetinget Tilfredshed med Spiringen. Udtyndingen faldt tidligt. Alle Beretninger gik da ogsaa, hvad Sukkerroer og Runkelroer angaar, ud paa, at Høsten deraf tegnede til at ville give meget stort Udbytte. Kaalroer og Turnips ere de i øvrigt gode Vilkaar komme langt mindre til Gode, fordi ogsaa disse Afgrøder have lidt megen Skade af Larve- og Insektangreb. — Græsmarkerne vare ikke frodige i Løbet af Sommeren. Det var først i Maj Maanedes Begyndelse, at Væksten begyndte, og allerede i Maanedens

Slutning klagede man over, at Græsset blev for groft. Aarsagen var, at Kløverplanterne vare faa og lidet udviklede, saa at Plantedækket var tyndt og væsentligst bestod af Græsser. Høsten af Agerhø faldt i Begyndelsen af Juli; «der høres kun sjældent Tale om en Middelhøst», hed det. Høsten indbjergedes hurtigt og for saa vidt i god Kvalitet, men den værdifuldeste Del, Kløveren, manglede. Engene have givet Middeludbytte eller derover, og Kvaliteten har været meget god. Om de senere Græsningsforhold blev det gentagende udtalt, at de var Aarets svageste Punkt, og 18. Juli hed det, at Græsmarkerne vare elendige. Fra 1. August og derefter forandredes Forholdet lidt efter lidt, saa at der mod Høstaarets Slutning var Overflod af Græs.

I Henhold til det foranstaaende kan Høstaaret 1905 foreløbig karakteriseres saaledes:

Høstaarets klimatiske Betingelser have været følgende: et mildt Efteraar, der uafbrudt tillod Markarbejdernes Fortsættelse og Fuldførelse, og som endvidere gav Vintersæden meget gunstige Førstebetingelser for en god Udvikling. Dog var Jordens stærkt udtørrede Tilstand i Periodens Begyndelse til Hinder saa vel for Hvedens rettidige Saaning som for Jordbehandlingen paa stærkt lerede Jorder. Vinteren var ualmindelig mild; men ret hyppige om end ikke store Temperatursvingninger bevirkede, at Plantedækket i de noget svagt udviklede Hvede- og Kløvermarker ikke drog fuld Nytte af den i øvrigt milde Temperatur. April var kold og regnfuld, saa at Sædetiden faldt sent for de tidligste Egne. Sommeren var varm og Nedbøren for Landet som Helhed rigelig. I Høstens første Tid var Vilkaarene fortsat gode; men den derefter indtraadte Regnperiode bevirkede, at Vaarsæden for en stor Del blev bjerget i tarvelig Tilstand.

For de Egne (navnlig i Jylland), som ikke fik tilstrækkelig Regn i Forsommeren, har Høstaaret et noget andet Præg end det almindelige, især da disse Egne for en stor Del ere de samme, som blev stærkest medtagne af de omfattende Larveangreb.

Af de mere almindelige Udtalelser fra Amterne om Høstens Udfald skal anføres følgende:

Københavns Amt: Høsten maa for Amtet i sin Helhed karakteriseres som en jævn Middelhøst. Den forholdsvis ringe Nedbør i 1904 bevirkede, at Jordens Bundvæde kun var ringe, og at den derfor ved Saaningen i Efteraaret og Foraaret var mindre tjenlig, et Forhold, der kendelig har indvirket navnlig paa Kvantiteten af Afgrøden af de egentlige Kornmarker. Hveden kom saaledes paa enkelte Egne end ikke op eller i hvert Fald kun slet, og Markerne maatte derfor omsaas i Foraaret. Byggen foldede ikke stærkt og den lange, tørre Forsommer har bevirket, at den paa Steder ikke skred igennem og altsaa ikke blev fuldt udviklet; en enkelt Beretning (Lindholm) anfører, at Bygmarkerne have været angrebne af Smeldelarver. Hvor Høsten har været tilendebragt inden Regnperioden ca. 20. August tog sin Begyndelse, er Kvaliteten af den bjergede Sæd god, men meget, navnlig Byg og Havre, blev paa de større Ejendomme først bjerget efter Regnperioden i daarlig Stand og er derfor kun af ringe Kvalitet. — Frederiksborg Amt: Medens Kvaliteten af Rugen paa Grund af heldigt Blomstringsvejr og godt Høstvejr er bleven god, har den langvarige Tørke i Forsommeren og det urolige Høstvejr i Slutningen af August og efterfølgende Tid medført, at saavel Kvantiteten som Kvaliteten af Høsten i øvrigt ikke har svaret til det Resultat, som det gunstige Vejr i Foraaret gav Haab om, ligesom det har medført, at Græsningen i Sommer til Tider har været meget ringe, hvorimod Efteraarsgræsningen har været god. Kaalroer og Turnips have været stærkt angrebne af Jordlopper og andre Insekter, saaledes at Ompløjning paa Steder har maattet finde Sted, og hvor dette ikke er sket, har Udbyttet været tarveligt. Udbyttet af Gulerødder har i de sidste 5 à 10 Aar været utilfredsstillende, da de angribes af den saakaldte „Krusesygdom“. — Sorø Amt: Øster Flakkebjerg Herred indberetter, at Turnips blev en Del ødelagt af Møllarven, at Hveden var tynd som Følge af den tørre Sommer og det tørre Efteraar 1904, samt at en ret væsentlig Del af Vaarsæden mange Steder henstod paa Marken under den 14 Dages stærke Regnperiode i Slutningen af August og i Begyndelsen af September d. A. Formanden for Sorø Amts landøkonomiske Selskab betegner Kvaliteten af Byg og Havre med „g“ for den Del, der blev indbjerget før 27. August, og med „mdlg“ for det, der blev indbjerget efter denne Dato. Formanden for de mindre Landbrugeres Landboforening for Sorø og tilgrænsende Amter har bemærket, at Høet blev høstet i udmærket Stand, den største Part af Sædhøsten ligeledes, men saa kom der Regn i 14 Dage, som gjorde, at den paa Marken staaende Sæd led betydelig Skade; —

som Helhed betegnes Udbyttet som god Middelhøst. Formanden for Ringsted-Egnens Landboforening har bemærket, at Høsten ikke blev saa god, som den tegnede til i Forsommeren. Varmen og Tørken i Juli Maaned bevirkede, at Byg og Havre blev kort i Straa. Kaal-roer og Turnips blev meget forringede ved Angreb af Jordlopper og Kaalmøllarver, Agerhøet blev for kort paa Grund af Tørken, og Sommergræsningen har af samme Grund været mindre rigelig. — Præstø Amt: Fra Tybjerggaard indberettes, at Kvaliteten af den meste Vaarsæd forringedes meget ved den langvarige Regnperiode. Paa de mindre Gaarde, hvor Afgrøden var i Hus, inden Regnperioden begyndte, er Kvaliteten gennemgaaende god. Vallø Birk indberetter, at Kvaliteten af Byg, Havre, Bælgsæd og Kartofler er forringet paa Grund af Regn i Høsttiden. Fra Lystrup Gods berettes, at Byggens Kvalitet er forringet meget ved det regnfulde Høstvejr, og fra Lundbygaard, at den langvarige Tørke og Larveangrebene have forringet Udbyttet navnlig for Byg og Turnips. Baroniet Stampenborg bemærker, at særlig den tørre Forsommer i betydelig Grad har forringet Aarets Høstudbytte, og Beldringe Gods udtaler, at der ikke faldt en ordentlig blødende Regn fra 13. Maj til 24. Juli. Fra Oremandsgaard indberettes, at Høsten af Vaarsæd paa Grund af Tørke er bleven meget mindre end paaregnet; af samme Grund er Hø og Græs ogsaa daarligt. Lilliendal Gods beretter, at Turnips og Roer har været angrebet i høj Grad af „Knoporme“, samt at der paa Byggen her og mange andre Steder har været Brand; endvidere har Havren paa Østergaard lidt meget af Insektangreb. — Bornholms Amt: Byfogden i Rønne indberetter, at den første Del af Sommeren var tør, men ved den Tid, da Enghøet blev høstet, indtraf betydelig Regn, hvorved meget Hø blev beskadiget. Rugen blev godt indhøstet, men, da Foraarssæden skulde høstes, indtraf stærk og vedvarende Regn; paa Grund af den her almindelige Staksætning blev dog ikke meget ødelagt. Det viser sig, at den stadige Regn har bevirket stærk Udbredelse af Kartoffelsygen. Efteraarsgræsningen har været meget rigelig. Herredsfogden i Vester Herred beretter, at Efteraarsgræsningen paa Grund af den store Nedbør vil være at ansætte til „mg“. Foraarssæden led af samme Grund megen Skade, saavel hvad angaar Straa som Kerne. Bornholms landøkonomiske Forening har bemærket, at der i 10 Dage i Høsten faldt fra 120 til 150 Millimeter Regn, hvilket forringede Udbyttet betydeligt. Fra Klemensker Sogn udtales, at Grunden til det daarlige Høstudbytte, som kan ventes af Sæden, er den tørre Forsommer og for Kvalitetens Vedkommende den vaade Høst. Fra Pedersker Sogn hedder det, at

hvad Kornsorterne angaar, maa Udbyttet vel antages at have givet en Middelhøst, men Kvaliteten er daarlig paa Grund af den idelige Regn. — Svendborg Amt: Høsten, der i den tidlige Forsommer tegnede ganske usædvanlig godt, er ikke bleven saa god som ventet; den lange tørre Periode i Juni og Juli skadede Høafgrøden meget; Kaalroer og Turnips have lidt overordentlig under Larveangreb, og den stærke Nedbør siden Slutningen af August sinkede og vanskeliggjorde Høsten af Vaarsæden, der baade i Kvantitet og Kvalitet forringedes betydeligt paa Grund af det ugunstige Høstvejr. — Odense Amt: Hvedens, Vaarsædens og Kartofflernes Kvalitet har lidt en Del ved det fugtige Høstvejr ligesom Havre- og Blandsæd-Udbyttet fra nogle Steder angives en Del forringet paa Grund af „Fritfluens“ Angreb. Kaalroer og Turnips, der ikke dyrkes meget, angives at have lidt en Del af Larveangreb (Kaalmøl). — Vejle Amt: Af de indkomne Indberetninger fremgaar det, at Havren, navnlig i Amtets Vestereg, flere Steder har været angreben af Fritfluen, og som Følge heraf har Udbyttet af Havrehøsten paa disse Steder været meget ringe. Rodfrugterne, især Turnips, have i saa godt som alle Egne af Amtet været hjemsegte af Insekter og Larver, saaledes at Udbyttet af Rodfrugtavlens endog i enkelte Indberetninger er betegnet med „maadelig“. — Aarhus Amt: Høsten 1905 har været under Middelhøst, idet den gode Avl af Rug og Hvede paa langt nær ikke opvejer det slette Resultat af Byg, Havre og Roer, hvilke Afgrøder udgør langt den overvejende Del af Høsten i Amtet. Aarsagerne til dette tarvelige Høstresultat ere ikke vanskelige at paavise. Den lange tørre Tid i Sommer har hemmet Planternes Vækst. Insekter har dernæst kastet sig over de smaa, modstandsudygtige Planter med en hidtil ukendt Voldsomhed; Fritfluen har hærget Havremarkerne, og Knoporm, Kaalmøl og Jordlopper have paa mange Steder næsten ryddet Kaalroe- og Turnipsmarkerne. Naar hertil kommer, at der omtrent samtidig med Begyndelsen af Vaarsædhøsten indtraf en stærk og vedvarende Regnperiode, kan det daarlige Høstresultat særlig for Byggens og Havrens Vedkommende ikke forbause. Paa Vintersæden, der ikke har lidt af Insektangreb, og som for en stor Del var høstet inden den omtalte Regnperiode, har Tørken ikke kunnet virke saa uheldbringende som paa Vaarsæden. Den lange tørre Sommer har naturlig bevirket, at Høet er blevet godt indbjerget, medens Kvantiteten særlig for Agerhøets Vedkommende er noget formindsket. Hertil kan ogsaa det kolde Foraar have medvirket ved at forsinke Græsplanternes Vækst. — Randers Amt: At Sommerkornet er under Middelhøst, skyldes den ringe Nedbør i Foraaret i Forbindelse

med en lav Temperatur om Natten, samt mulig hist og her Larveangreb. Rodfrugterne have ligeledes lidt ved Tørken og senere ved Angreb af Larver. — Aalborg Amt: Høsten med Undtagelse af Rugen har adskillige Steder lidt stærkt under den vedvarende Tørke; dette gælder navnlig Byggen. Havren er de fleste Steder bleven ødelagt af Fritflueangreb, der ogsaa flere Steder har skadet Byggen meget. Rodfrugterne (Roer, Kaalrabi og Turnips) ere stærkt forringede paa Grund af Larve- og Svampeangreb. Navnlig har Turnips de fleste Steder været stærkt udsat for disse Angreb. — Hjørring Amt: Høstudbyttet af de enkelte Sædarter er meget forskelligt. Medens Rugen, Kartofflerne, Agerhøet, Enghøet og Runkelroerne, hvilke sidste kun dyrkes lidet her i Amtet, have givet et Udbytte, der staar over det normale, og medens Udbyttet af Havren, Turnips og Sommergræsningen kun er ringe, have de andre Sædarter givet en Middelhøst. I øvrigt have Forholdene været ikke lidet forskellige i de forskellige Egne af Amtet; Larveangrebene, som ere den væsentligste Aarsag til Høstens daarlige Resultat, have saaledes ikke overalt haft den samme Voldsomhed og have navnlig anrettet betydelig mindre Skade i den vestlige end i den østlige Del af Amtet. Vinteren var usædvanlig mild, og Foraaret begyndte med godt Vejr. I April Maaned og den første Halvdel af Maj var Vejret gunstigt for Vaarsædens Lægning, men i den sidste Del af Maj og ind i Juni led Markerne ved Nattefrost og tørt Vejr, som hemmede Vaarsædens og Rodfrugternes Udvikling. I Midten af Juni faldt der i den vestlige Del af Amtet en Del Regn, der virkede heldigt paa Vaarsæden, Rodfrugterne og Græsset, men i andre Egne vedblev Tørken gennem Juni og Juli Maaneder. Slutningen af August Maaned og en Del af September vare meget regnfulde. Den milde Vinter i Forbindelse med det usædvanlig varme Vejr i Maj Maaned og Sommerens Tørke have i høj Grad begunstiget Larvernes Angreb. Da Vejret i den første Halvdel af August var smukt, forløb Rughøsten, som paabegyndtes og til Dels afsluttedes i denne Tid, meget gunstigt, men det regnfulde Vejr i September Maaned har vanskeliggjort Indhøstningen en Del. — Ringkøbing Amt: Høstudbyttet for Amtet som Helhed er under Middelhøst for Vaarsæden, over Middelhøst for Rodfrugter og Høafgrøderne. Ferringelsen under det normale tilskrives forskellige Aarsager — Nattefrost sidst i Maj, Tørke i Forsommeren og Larveangreb. Kvalitetens Ferringelse skyldes væsentlig den vaade Høst. Af de lokale Indberetninger anføres følgende. Bølling-Nørre Herreders Landboforening udtaler, at Byggen paa Grund af den langvarige Tørke blev baade tynd og kort, og da

Amtene	Hvede			Rug			Byg			Havre		
	Kvantitet	Kvalitet	Holl. Vægt	Kvantitet	Kvalitet	Holl. Vægt	Kvantitet	Kvalitet	Holl. Vægt	Kvantitet	Kvalitet	Holl. Vægt
Københavns . . .	g	g+	130	g+	mg	124	g	g	112	mg÷	g+	87
Frederiksborg . .	g	mg	131	g	mg	124	g	g	112	g	g	84
Holbæk	g	mg	132	mg÷	mg	125	g	g+	114	mg÷	mg÷	87
Sorø	g÷	mg	132	mg	mg	125	g	g	112	g+	g	86
Præstø	g	mg	131	g	mg	124	g	tg	111	g	g	85
Bornholms	tg	g+	129	mg÷	g+	121	tg+	tg+	109	tg+	g÷	81
Maribo	tg+	mg	131	mg	mg	124	g	g÷	112	g+	mg÷	85
Svendborg	mg	mg+	132	mg	mg+	125	g+	g	112	mg÷	g	83
Odense	mg	mg	132	mg	mg	126	g	g	114	g	g	84
Vejle	mg	mg	131	mg	mg	123	g	g	110	g	g	81
Aarhus	mg÷	mg+	131	mg+	mg+	124	tg+	tg+	110	mdl+	tg+	82
Randers	mg	mg	130	mg	mg	124	tg÷	tg	109	tg÷	tg	79
Aalborg	ug	ug	133	mg+	ug÷	122	g÷	g÷	109	mdl+	tg÷	79
Hjørring	mg÷	g+	—	mg+	mg+	122	g÷	g	106	mdl	tg÷	74
Thisted	mg+	g+	129	mg	mg	124	tg	g	106	tg÷	tg	82
Viborg	g	mg÷	129	mg	mg	123	tg÷	tg	103	mdl+	tg÷	78
Ringkøbing	—	—	—	mg+	mg+	123	g÷	g÷	103	mdl+	tg	77
Ribe	g	mg	131	mg	mg	122	g	g	102	tg	tg	79
Gennemsnit for hele Landet }	g+	mg		mg	mg		g÷	g÷		tg	tg+	

Amtene	Kartofler		Sukkerroer		Runkelroer		Kaalroer		Turnips		Andre Rodfrugter	
	Kvantitet	Kvalitet	Kvantitet	Kvalitet	Kvantitet	Kvalitet	Kvantitet	Kvalitet	Kvantitet	Kvalitet	Kvantitet	Kvalitet
Københavns . . .	mg÷	g+	—	—	mg	mg	g	g+	g	g	g	g
Frederiksborg . .	mg	g	—	—	mg	mg	g	g	tg	g	g	g
Holbæk	mg	mg÷	—	—	mg+	mg	g	g+	g÷	g÷	g+	g
Sorø	g+	g+	—	—	mg	mg÷	tg	g	tg	g	g	g
Præstø	g	g	mg	mg	mg	mg	tg	g	tg	g	mg	mg
Bornholms	mg÷	g÷	—	—	mg	g+	g	g÷	g÷	g÷	mg÷	g
Maribo	mg÷	g+	mg+	mg÷	mg+	mg	g+	g+	g	g+	mg	mg
Svendborg	mg÷	g+	mg÷	g+	mg÷	mg÷	g÷	g÷	g÷	g	mg÷	mg÷
Odense	mg	g	mg	mg	mg	mg	g	g	g	g	g	g
Vejle	mg	mg	g	g	mg	mg	g	g	g	g	g	g
Aarhus	g+	g+	g	g	mg÷	mg÷	tg+	g÷	tg÷	g÷	g	g
Randers	mg	mg÷	—	—	mg÷	mg÷	g÷	g÷	tg÷	g÷	g+	g+
Aalborg	mg÷	mg	—	—	mg÷	mg÷	g+	g+	g÷	g÷	g+	g+
Hjørring	mg÷	mg÷	—	—	mg÷	mg÷	g	g+	tg+	g÷	g	g
Thisted	mg÷	g+	—	—	g	g	g÷	g	g	g	g	g
Viborg	mg÷	g+	—	—	mg÷	mg	g+	g+	g÷	g	g÷	tg+
Ringkøbing	mg	mg÷	—	—	mg÷	mg÷	g+	g+	g+	g+	g+	mg÷
Ribe	mg	mg	mg	mg	mg	mg	g	g	g	g	mg	mg
Gennemsnit for hele Landet }	mg÷	mg÷	mg	mg÷	mg	mg	g	g	g÷	g	g	g

Anm. Ved Kornsorterne er det Kerneudbyttet, hvis Karakter er angivet.
 *) Til «andre Handelsplanter» henregnes Hør, Humle, Kommen m. m.

Bælg-sæd		Boghvede		Raps o. a. Handelspl. *)	
Kvantitet	Kvalitet	Kvantitet	Kvalitet	Kvantitet	Kvalitet
g +	g +	—	—	—	—
g	g	—	—	—	—
g	g +	g	g	mg +	g
g	g	—	—	—	—
g	g	mg	—	—	—
g	g ÷	—	—	—	—
g +	g +	g	g	g +	mg ÷
g +	g +	g	g	mg ÷	g +
mg	mg	g	g	mg	mg
g	g	mg	g	mg	mg
tg +	tg +	mg ÷	g	—	—
tg	tg +	g	g	mg	mg
tg +	g ÷	mg ÷	mg ÷	—	—
g ÷	g	—	—	—	—
tg +	g ÷	—	—	—	—
tg +	g ÷	mg ÷	g +	—	—
g ÷	g ÷	mg ÷	mg ÷	—	—
mg	mg	mg	mg	ug	ug
g	g	mg ÷	mg ÷	—	—

Tiden kom, da den skulde indhøstes, indtraf en Regnperiode, hvorved Sæden tog megen Skade. Havren blev stærkt angreben af Fritfluen, saa at Udbyttet blev meget daarligt; hertil bidrog vel ogsaa den lange Tørke. Fra Hovedgaarden Slumstrup bedømmes Aarets Høst at være saa slet som ingensinde i de sidste 42 Aar. Fra Viumgaard hedder det, at Havren kom godt op, men den blev ødelagt af Fritfluen, saa at mere end Halvdelen af Plantebestanden gik bort.

Af den hosstaaende tabellariske Oversigt fremgaar det, hvorledes Høstens Udfald for hver af de forskellige Sædarter m. v. er bleven bedømt i de enkelte Amter, saavel hvad Kvantiteten som hvad Kvaliteten angaar; Karakteren «g» (godt) er Udtryk for Middelhøst. De af Amterne afgivne Bedømmelser ere Gennemsnitsresultater af Opgivelser, der ere indhentede fra større og mindre Jordbrugere, Landboforeninger, Retsbetjente m. fl. inden for hvert Amts Omraade. De i Tabellen anførte Gennemsnitskarakterer for hele Landet ere beregnede under Hensyntagen til Størrelsen af det til de forskellige Afgrøder i hvert enkelt Amt anvendte Areal, saaledes som dette opgjordes for Aaret 1901 («paatænkt Anvendelse», jfr. Statistiske Meddelelser, 4. Række, 11 Bd., Hæfte 7). For Sommergræsningens Vedkommende er Hovedkarakteren dog et simpelt Gennemsnit af Amtskaraktererne.

Om de enkelte Afgrøder skal man bemærke følgende:

Af Vintersæden ligger Hvedens kvantitative Udbytte noget over Middelhøst,

Agerhe		Enghe		Sommergræsning
Kvantitet	Kvalitet	Kvantitet	Kvalitet	
g ÷	mg ÷	g	g +	g
g	g	g	g	g
g	mg	mg ÷	mg ÷	g +
g ÷	mg	g	mg ÷	g ÷
g	mg	g	g	g
tg +	g	g	g	g +
tg +	mg	g +	g +	g ÷
g	mg	mg	mg	g ÷
g	mg	g	mg	mg
g	mg	g	mg	g
tg +	mg ÷	mg ÷	mg ÷	tg
g ÷	g +	g +	g +	tg
g ÷	mg	mg ÷	mg	tg +
mg ÷	mg ÷	g +	mg ÷	tg +
g	mg ÷	g	mg	mdl +
g ÷	mg ÷	g +	mg ÷	tg
g +	mg	mg ÷	mg	g ÷
tg	g	g	mg	g
g	mg ÷	g +	mg ÷	g ÷

Kvaliteten har endog været meget god. Man maa imidlertid erindre, at der paa Øerne er ompløjet en Del Hvedemarker i Foraaret — i hvor stort Omfang vides ikke. Medens Amternes Middelkarakter for Hveden er meget varierende paa Øerne (lav paa Lolland-Falster, høj paa Fyn), er Udbyttet i de jyske Amter gennemgaaende mere ensartet og ogsaa bedre end paa Øerne. Rugens Høstudbytte har, baade hvad Mængde og Kvalitet angaar, været særdeles godt; ogsaa for denne Sædart ligger Udbyttet mere over Normalen i Jylland end paa Øerne.

Af de særlige Udtalelser om Vintersæden fremdrages følgende:

Holbæk Amt: Fra Kalundborg Omegns Landboforening indberettes, at Hveden delvis var gaaet ud. — Sorø Amt: Fra Høve bemærkes om Hveden, at en Del maatte ompløjes og Arealet besaas med andre Afrøder; den Del, som ikke blev ompløjet, kan betegnes som „tg“. — Præstø Amt: Gjorslev Gods udtaler, at Grunden til, at Hveden paa de under Godset hørende Gaarde har givet et ringe Udbytte, formentlig er den, at Efteraaret var meget tørt, og Hveden derfor ikke kraftig nok til at modstaa nogle Dages stærk Rimtaage. Fra Landboforeningen for Stevns Herred og Omegn hedder det, at Vinterens vekslende Vejr har skadet Hveden, som tillige har lidt af Larveangreb. Fra Oremandsgaard berettes, at Hveden mange Steder er gaaet bort, uden at Grunden kan paavises. Fra Marienborg Gods udtales, at Grunden til den daarlige Hvedehøst nærmest maa søges i, at Jorden forrige Efteraar var for tør, saa at den læskede Hvedes Spireevne forringedes i den Grad, at der i Hvedemarkerne blev store bare Pletter, der maatte ompløjes i Foraaret. Møens Landboforening skriver, at Hveden delvis er gaaet bort i Vinter og angrebet af Larver i Foraaret. — Maribo Amt: Hveden led meget ved Angreb af Blomsterfluens Larve og blev derfor mange Steder ompløjet. — Aarhus Amt: Hvedehøsten har saavel i kvantitativ som i kvalitativ Henseende været over Middelhøst; om Rughøsten beretter samme Amt, at Udbyttets Mængde endog er betydelig over Middelhøst, og det samme gælder Kvaliteten. — Hjørring Amt: Rugen har givet et ualmindelig godt Resultat, hvilket skyldes den heldige Overvintring i det milde Vintervejr samt det sjældent gode Vejr i Blomstringstiden. — Viborg Amt: Den tørre Sommer i 1904 bevirkede, at Rugen blev tidlig saaet og nedlagt i vel behandlet Jord, hvilket i Forbindelse med det gode Vejr i Forsommeren bragte

en saavel i Kvantitet som i Kvalitet fortrinlig Høst, der paa flere Steder endog angives at være udmærket god.

Af Vaarsæden har Byggen 'givet under Middelhøst saavel i kvantitativ som i kvalitativ Henseende. Det er navnlig i Jylland og paa Bornholm, at Udbyttet har været under det normale. Havrens Høstudbytte ligger betydelig under Middelhøst, og for denne Sædarts Vedkommende er det i endnu højere Grad de jyske Amter, der bestemme Afgrødens Hovedkarakter; thi i samtlige Øamter undtagen Bornholms har Udbyttet været Middelhøst eller derover, hvorimod i Jylland kun Vejle Amt har haft Middelhøst.

Om disse de langt betydeligste Vaarsædsafgrøder indberettes følgende:

Holbæk Amt: Kalundborg Omegns Landboforening beretter, at Byggen tog megen Skade under Høstningen, og Ods Herreds Landbrugsforening, at den langvarige Tørke har forringet Byggen, baade i Kvalitet og Kvantitet. Fra Toftholm anføres, at saavel Byggens ringe Kvantitet som Kvalitet begrundes i Foraarets Tørke og i, at der stod megen Byg ude i Regnperioden. Byfogden i Holbæk samt Herredsfogden i Løve Herred indberette, at Byg- og Havrehøsten led en Del Skade ved det vanskelige Høstvejr. Birkedommeren paa Samse meddeler, at Kvaliteten navnlig af Byg kun blev ringe, hvor Høsten ikke var sluttet inden 25. August. Havren har til Dels været angreben af Havreaal, men i øvrigt have Larveangrebene ikke gjort synderlig megen Skade her. — Maribo Amt: Det mindre gode Udbytte af Byg og Havre skyldes nærmest en for langvarig Tørke i Juni og Juli, og Kvaliteten er flere Steder daarlig paa Grund af en for hurtig Modning. — Hjørring Amt: Foraarsæden blev saadet under gunstige Forhold, men Nattefrosten og Tørken hemmede Væksten en Del. Hovedaarsagen til det daarlige Udbytte maa dog søges i de voldsomme Larveangreb, for hvilke Foraarsæden har været udsat. Navnlig har Havren lidt under Angreb af Fritfluens Larve. I mange Egne særlig i den østlige Del af Amtet er Havren fuldstændig ædt op, saa at man i disse Egne med Rette kan tale om Misvækst for denne Kornarts Vedkommende. I den vestlige Del af Amtet er Skaden derimod mindre, særlig paa saadanne Steder hvor Havren blev saadet tidligt, og hvor den derfor havde opnaaet større Modstandskraft, da Larveangrebene begyndte. Ogsaa Byggen har enkelte Steder lidt meget under Angreb af Stankelbenlarverne, men Angrebene

paa Bygmarkerne have dog været temmelig spredte og kunne næppe antages at have haft væsentlig Indflydelse paa Gennemsnitsudbyttet. — Viborg Amt: Havren og Byggen blev gennemgaaende sildigt saaede, og hemmedes i Udviklingen af en stærk Tørke i Juni og Juli, hvortil kom et usædvanlig ondartet Angreb af Fritfluelarven, der paa sine Steder endog i den Grad ødelagde Sæden, at man kan tale om fuldstændig Misvækst. Endvidere gjorde den stærke Regn i Høstens Slutning sit til, at de nævnte Sædarter tog Skade i Hobene paa Marken, af de idelige Omflytninger og kom daarligt i Hus. Alle disse Omstændigheder bevirkede, at Havren og Byggen baade i kvantitativ og kvalitativ Henseende gav et meget tarveligt Udbytte, der ligger langt under Middelhøst.

Bælgsæden har for Landet som Helhed givet Middelhøst saa vel kvantitativt som kvalitativt; størst var Udbyttet paa Øerne. Høsten af Boghvede har været over Middelhøst og Udbyttet af « Handelsplanter » fortrinligt.

Af Rodfrugterne have Kartofflerne som Helhed og saa godt som overalt givet over Middelhøst baade i Kvantitet og Kvalitet; daarligst var Udbyttet paa Bornholm.

For Sukkerroerne har Aaret været meget heldigt; navnlig har Mængdeudbyttet været betydelig over Middelhøst, men ogsaa Kvaliteten var meget tilfredsstillende.

Runkelroerne ere i saa at sige alle Amter bedømte til at give et særdeles godt Udbytte baade i Kvantitet og i Kvalitet.

Kaalroerne have for Landet som Helhed givet Middelhøst baade i Kvantitet og Kvalitet, men Forholdene ere her mindre ensartede i de forskellige Egne end for de tre fornævnte Arter af Rodfrugter.

Om Turnips gælder det samme og i endnu højere Grad end for Kaalroerne; det kvantitative Udbytte ligger her tilmed noget under Middelhøst.

Andre Rodfrugter have givet Middelafrøde baade i Mængde og Kvalitet.

Om disse Afrøder fremdrages følgende Udtalelser:

Hjørring Amt: Kartofflerne, som i det hele taget have givet et godt Udbytte, have dog i enkelte Egne lidt under Tørken, hvor

de derfor kun satte faa Knolde. — Viborg Amt: Kartofflerne lykkedes særdeles godt. — Københavns Amt: Roerne ere gennemgaaende tilfredsstillende; men Kaalroer og Turnips have paa enkelte Egne, navnlig i Gl. Roskilde Amt (Lindholm Gods og Omegnen af Karlslunde) været angrebne af Kaalmøllarven og Jordlopper. Markerne have derfor maattet saas om endog flere Gange og frembyde desuagtet bare Pletter, hvor Afgroden er ædt bort; det, der er tilbage, fylder derhos kun lidt og giver saaledes kun ringe Udbytte. — Holbæk Amt: Fra Toftholm indberettes, at Kaalroer, Turnips og andre Rodfrugters Ringhed mest er begrundet i Larveangreb og sen Vækst i Foraarstørken. Fra Kaltredgaard berettes, at Kaalroer og Turnips delvis ere ødelagte af Kaalmøllens Larve og de resterende Planter senere gennemborede af andre Larver. Fra Aagerup udtales, at naar Turnips i Aar har været tilbage i Væksten, skyldes dette, at den i den første Væksttid blev angreben af Jordlopper. Herredsfogden i Skippinge Herred beretter, at Kaalroerne paa Birkendegaard og Ege-mark angives at være ødelagte af Insekter, sidstnævnte Sted af Jordlopper. Fra Birkedommeren paa Samsø berettes, at Larveangrebene ikke her have gjort synderlig Skade. — Maribo Amt: Udbyttet af Rodfrugter er over et Middelaars paa Grund af særlig gunstige Forhold. — Hjørring Amt: Roerne tegnede fra først af godt, men i Juli Maaned blev de angrebne i Toppen af Kaalmøllarven, og det tegnede en Tid til, at Turnips- og Kaalroemarkerne i mange Egne, særlig i den midterste og østlige Del af Amtet, skulde mislykkes. Den indtrufne Regn og det køligere Vejr, som afløste Sommerens usædvanlige Varme, bragte dog en forbausende Forandring, saa at Udsigterne til en ret god Høst bedredes betydeligt. Under Rodudviklingen er der imidlertid mange Steder gaaet Knoporm i Roden, og særlig har den sildigt saaede Turnips lidt meget af Knopormens Angreb. — Viborg Amt: Oprindeligt stod Roerne udmærket, men paa Grund af den langvarige Tørke i Midtsommeren og Larveangreb (Knoporm og Kaalorm), der til Dels standsede Væksten, blev Høsten i det hele noget mindre end sædvanlig, hvilket særlig gælder Turnips. Runkelroer angrebes ikke og lykkedes særdeles godt.

Høsten af Agerhø har, navnlig hvad Kvaliteten angaar, været meget tilfredsstillende. Mængdeudbyttet har varieret stærkt fra Amt til Amt; for Landet som Helhed maa det dog betegnes som Middelhøst. Ogsaa for Enghøets Vedkommende var Kvaliteten bedre end Kvantiteten; i Kvantitet var Udbyttet som Helhed bedre

end Agerhøets, og, saavel hvad Mængde som Beskaffenhed angaar, har Udbyttet i de fleste Amter været over og ikke i noget Amt under et Middelaars.

Sommergræsningens Karakterbetegnelser variere mellem «mg» (Odense Amt) og «mdl+» (Thisted Amt). I Øernes Amter var Sommergræsningen som Helhed middelgod; i Jylland har kun Vejle og Ribe Amter betegnet Græsningen som normal; i alle øvrige jyske Amter ligger Karakteren ikke lidt derunder.

Om disse Afgrøder indberettes følgende:

Københavns Amt: Da første Aars Kløver paa Grund af Tørken forrige Aar og den tørre Forsommer i Aar delvis mislykkedes, blev Udbyttet af Agerhø og af Foraarsgræsningen mange Steder tarveligt, hvorimod Sommer- og Efteraarsgræsningen har været god. — Maribo Amt: Kulde i Foraaret og Tørke i Sommeren har bevirket et ringe Udbytte af Agerhø. — Hjørring Amt: Den vedvarende Tørke i Sommer var ikke gunstig for Sommergræsningen, der en Tid var meget tarvelig, men dog bedredes noget paa Grund af Efteraarets fugtige Vejr. — Viborg Amt: Medens Kvaliteten af Høet er bleven ret god paa Grund af det heldige Indbjergningsvejr, er Kvantiteten noget ringere, særlig for Agerhøets Vedkommende, paa Grund af den stærke Tørke og en Del Nattefrost. Sommergræsningen, der begunstigedes af det gode Vejr i Forsommeren, lovede oprindelig godt, men under den tørre Periode i Midtsommeren stod Græsset helt i Stampe, ja kom næsten slet ikke frem. Resultatet kan derfor kun betegnes som meget tarveligt for Sommergræsningens Vedkommende. — Ringkøbing Amt: Fra He Sogn berettes, at Enghøet er under Middelhøst, hvilket rimeligvis skyldes den megen Nattefrost i Juni Maaned. Fra Skodborg-Vandfuld Herreders Landboforening meddeles, at Udbyttet af Græs var yderst daarligt i den østlige Del af Foreningens Omraade, men i den vestlige Del ualmindelig godt paa Grund af den stærke Nedbør den 16. Juni (88^{mm}).

De for Aaret 1905 karakteristiske Angreb af Insekter og Larver have været saa omfattende, at Bureauet fandt sig foranlediget til at tilvejebringe nærmere Oplysninger herom. Igennem Amterne udsendtes til samtlige Landboforeninger særlige Spørge-

skemaer om Larveangrebene Natur og Omfang. Resultatet af de indkomne Besvarelser foreligger skematisk fremstillet i efterfølgende Oversigt (S. 24—29), hvis Talrubrikker angive, hvor mange Procent Høstudbyttet antages at være blevet forringet paa Grund af Larveangreb.

Det fremgaar heraf, at Angrebene paa Kornafgrøderne have været af ringe Omfang paa Øerne. Hvedeafgrøderne maa dog maaske undtages, idet ikke faa Landboforeninger udtale sig om «Blomsterfluens» Angreb som Aarsag til Ompløjning af Hvedemarken; det maa imidlertid ikke glemmes, at Sædeforholdene for Hveden vare særlig ugunstige i Efteraaret 1904 paa Landets sværeste Jorder. I Jylland har den foraarsagede Skade været af langt større Betydning. Byggen har navnlig været angreben i det sydøstlige Jylland, hvor den ved Larveangrebene foraarsagede Forringelse af Udbyttet ret gennemgaaende er anslaaet til ca. 25 pCt. Angrebene paa Byggen angives overalt at være optraadt spredt, men hvor Angrebene have fundet Sted, have de været des voldsommere. Angrebene paa Havren have derimod været langt mere almindelige, idet næsten alle jyske Landboforeninger karakterisere Forringelsen som meget betydelig. Skaden har dog ogsaa her været meget forskellig; i flere Egne i det sydøstlige Jylland, Fredericia-Eggen og i hvert Fald delvis i de nordligere Østkystegne indtil Kalø Vig har Forringelsen saaledes været ringe, medens der fra flere Egne i Aalborg, Viborg og Ringkøbing Amter indberettes om en Forringelse af Havrehøstens Udbytte, der grænser til total Ødelæggelse. At det i det væsentlige er Larveangrebene sjældne Voldsomhed, der har bragt Udbyttet af Havre saa langt ned i Jylland, kan næppe betvivles. Det er i øvrigt allerede omtalt, at Foraarsværket har medvirket til Forringelsen i de Egne, hvor Sommerregnen længst lod vente paa sig.

For Rodfrugternes Vedkommende have Angrebene af Skadedyr været ikke mindre af Omfang end for Kornafgrøderne, men Udbyttets Forringelse er som Helhed langt mindre. Selv om der ogsaa forekom enkelte fuldstændig ødelagte Rodfrugtafgrøder, oversteg Høstudbyttets Forringelse paa Grund af Larveangreb sjælden

Landboforening	Høstudbyttets Forringelse paa Grund af Larveangreb anslaaes til (pCt.)			
	Byg	Havre	Kaalroer	Turnips
	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
København's Amt:				
København's Amts Lbf.	"	"	20	20
Ramsø-Tune Herreders Lbf.	"	"	25—33	
Gamle Roskilde Amts Lbf.	"	"	33	
Frederiksborg Amt:				
Frederiksborg Amts Lbf.	"	—	"	—
Hørsholm Distrikts økonomiske Selskab. .	"	—	"	—
Horns Herreds Lbf.	"	"	—	ikke over 25
Holbæk Amt:				
Holbæk Amts økonomiske Selskab.	"	"	—	—
Holbæk Amts Lbf.	"	"	"	"
Kalundborg Omegns Lbf.	"	"	—	—
Odsherreds Lbf.	"	"	"	25
Samsø Lbf.	"	"	"	—
Sorø Amt:				
Sorø Amts landøkonomiske Selskab.	"	"	"	"
Sorø-Egnens Lbf.	"	"	"	"
De mindre Landbrugeres Lbf.	"	"	"	"
Ringsted-Egnens Lbf.	"	"	25	25
Skelskø-Egnens Lbf.	"	"	"	"
Haslev og Omegns Lbf.	"	—	33	
Præstø Amt:				
Præstø Amts Lbf.	"	"	50	—
Landboforeningen f. mindre Landbrugere. .	"	"	over 50	75
Tureby-Køge Lbf.	"	"	"	"
Stevns Herreds og Omegns Lbf.	"	"	"	"
Næstved og Omegns Lbf.	"	"	"	"
Møens Lbf.	"	"	"	"
Bogø Lbf.	"	"	33	
Bornholms Amt:				
Bornholms landøkonomiske Forening.	"	"	"	"
Maribo Amt:				
Maribo Amts økonomiske Selskab.	"	"	"	"
Østlollands Lbf.	"	"	"	"
Vestlollands Lbf.	"	"	"	"
Nordfalsters Lbf.	"	"	"	"

Anmærkninger

- { Skaden paa Kaalroer og Turnips har vekslet fra en Ubetydelighed til næsten fuld-
stændig Ødelæggelse.
- { Kun enkeltvis kan der være Tale om mislykkede Kornafgrøder; Sommerens Frugt-
barhed har bødet paa den forvoldte Skade. Kaalroe- og Turnipsmarker ere kun
enkeltvis gaaede helt fri for Angreb af Kaalmøl, adskillige Marker har man
maattet ompløje.
- { Kaalmøl og Knoporm har i forskellig Grad paa de forskellige Egne angrebet Roe-
markerne.
- { I Blandsædsmarkerne er Havren delvis bortødt af Havreaal, Skaden anslaaes til
2-3 Fold. Hvor Angreb har fundet Sted paa Turnipsmarker, er Forringelsen
enten total eller indtil $\frac{1}{5}$ af normal Afgrøde.
- { Havreaafgrøden er pletvis ødelagt af Fritfluellarven. I Turnipsmarker er det almin-
deligt, at Planterne ere bortødt af Kaalmøllarver.
- { Enkelte Steder er hele Turnipsafgrøden ompløjet, men de fleste Steder have Planterne
uden iøjnefaldende Skade modstaaet Angrebene.

Som Helhed er Tabet af ringe Betydning.

- { Enkelte Kaalroemarker ere fuldstændig ødelagte, Tabet paa Turnipsafgrøden ansættes
til $\frac{1}{8}$, men begge Roearter dyrkes kun lidt.
- { Kun den tidligst saaede Turnips har taget væsentlig Skade, antagelig $\frac{1}{4}$ af Normal-
udbytte.
- { Larveangreb paa Kaalroer og Turnips har i 1905 ubetinget været mindre end sæd-
vanlig.
- { Omsaaede Roemarker, der havde lidt af Larveangreb, blev ikke senere angrebne.

Kun Kaalroe- og Turnips-Afgrøder have været angrebne.

Havren har i mindre Grad været angreben af Havreaal.

Af Turnips er mindst Halvdelen ødelagt, Kaalrabi omtrent alt — mest af Jordlopper.
Turnips og Kaalrabi har det været saa godt som umuligt at dyrke i Aar.

Man formoder, at Hveden har været angreben af Larver.

- { Hveden led af Kornets Blomsterfluellarve og maatte mange Steder ompløjes. Skaden
paa det ikke ompløjede anslaaes til 25-33 pCt. I Sukkerroemarkerne, der vare
stærkt angrebne af Larver, anslaaes Høstudbyttet til 250 Ctnr. mod 400 Ctnr.
normalt.

- { Hvor Hvedemarkerne have været angrebne af Larver i mindre Grad og ikke blev
ompløjede, er Udbyttets Forringelse ca. 25 pCt. Sukkerroerne have pletvis været
angrebne af Rodbrand. Forringelsen anslaaes til 33 pCt.
- { Hveden har været angreben pletvis over hele Stiftet og en Del er ompløjet. Skaden
paa den mindst beskadigede Del — de ikke ompløjede Arealer — anslaaes til
2 Fold.

Landboforening	Høstudbyttets Foringelse paa Grund af Larveangreb anslaaes til (pCt.)			
	Byg	Havre	Kaalroer	Turnips
Svendborg Amt:	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Svendborg og Omegns Lbf.	"	"	25—50	—
Langelands landøkonomiske Forening	"	"	"	"
Ærø Lbf.	"	"	"	"
Odense Amt:				
Fyns Stifts patriotiske Selskab	"	"	"	—
Odense Omegns Lbf.	"	"	"	"
Aarup Omegns Lbf.	"	"	"	50
Baag og tilgrænsende Herreders Lbf.	"	—	25	"
Vends Herreds og Wedellsborg Birks Lbf.	5—10	—	—	—
Nordfynske Lbf.	"	"	"	"
Hindsholms Lbf.	"	—	12	"
Vejle Amt:				
Vejle Amts Lbf.	"	25	—	25—50
Vejle Vesteregns Lbf.	25	25	25	25
Sønder Omme og Omegns Lbf.	"	50	"	"
Brandø og Omegns Lbf.	"	50	10	10
Elbo Herreds Lbf.	"	"	33	25—33
Børkop og Fredericia Omegns Landbrugsf.	"	"	33	25
Kolding Herreds Lbf.	"	"	ompløjet	under 17
Aarhus Amt:				
Aarhus Amts landøkonomiske Selskab	—	25—33	—	—
Hads Herreds Lbf.	"	"	33	33
Horsens Landbrugsforening	—	25	25—30	—
Skanderborg Lbf.	15	40	20	—
Ny Solbjerg Lbf.	"	10	33	33
Tyrsting-Vrads Herreders Lbf.	"	25	17	33
Vrads Herreds Lbf.	"	33—50	20	—
Tørring og Omegns Lbf.	"	50	25	—
Høver og Omegns Lbf.	33	33	33	33
Randers Amt:				
Randers Amts Husholdningsselskab	5—10	30	20	—
Randers Amts nordvestlige Lbf.	25	50	"	"
Mariager og Omegns Lbf.	"	33	33	33
Randers Amts nordøstlige Lbf.	25	33	"	"
Rougsø-Sønderhald Herreders Lbf.	"	—	"	"
Kolind Lbf.	13	25	20	—
Grenaa Lbf.	25	33	33	50
Kalø Vig Lbf.	25	under 25	40	—
Kalø-Knebelvig Lbf.	25	"	25	25
Mols og Sønder Herreds Lbf.	"	25—75	30—60	—

Anmærkninger

Skaden er ubetydelig.

Kun pletvis paa Turnips.

Fritfluen har ikke angrebet alle Havremarker, Skaden anslaaes til 4 Fold.

{ Byggen har været angreben overalt, Havren almindeligt, men meget forskelligt; i
{ velplejede Marker er Skaden uvæsentlig, i sent saaede er Skaden 1—2 Fold.

{ Kun enkelte Havremarker have været angrebne, Kaalroe- og Turnipsmarker mere
{ almindeligt.

Turnips har mange Steder maattet omløjes, andre Steder er Forringelsen $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$.

{ Havreafrøden er dels helt mislykket, dels nedbragt til $\frac{1}{2}$ og dels til $\frac{1}{4}$ af Middel-
{ høst. Roeafrøden skønnes ikke at være væsentlig forringet.

Havren blev mange Steder fuldstændig ødelagt.

Tidligt saaede Turnips forringet med $\frac{1}{3}$, sildigt saaede med $\frac{1}{4}$.

Langt den overvejende Del af Kaalroeer maatte omløjes og erstattes med Turnips.

Jordløpper ødelagde Kaalroemarkerne, der besaaedes med Turnips; disse angrebes af

Kaalmøllen.

{ Havren angrebes af Fritfluen, Kaalroeer og Turnips af Kaalmøllen, Byggen i mindre
{ Grad af Bygfluellarven; Skaden paa Roerne har været betydelig, men ikke saa

stor som paa Havren.

Skaden fordeler sig meget forskelligt og er derfor vanskelig at opgive.

{ Angrebene have været forskelligt ondartede, i Egnene vest for Horsens mest, mindst i
{ de østlige og sydlige Egne. Bygfluellarven optraadte mindre almindelig, men

mere ondartet og særligt paa sent saaede Marker.

{ Angrebnes Intensitet er betinget af Beliggenhed, Sædetid og Jordbeskaffenhed og
{ for Havrens Vedkommende af Sædarten.

Angrebene paa Havren gælder den hvide Havre; mange Marker bleve helt omløjede.
Skaden paa Havren ligger mellem $\frac{1}{3}$ og $\frac{3}{4}$, paa Roerne anslaaes den til 100 Tdr. pr.
Td. Land.

Foruden ved Larveangrebene foraarsagedes Skaden paa Roerne ogsaa af Kaalbroksvampen.

Roerne overvandt Kaalmøllens Angreb, men mod Efteraaret angrebes de af Knoporm.

{ Skaden paa Havren har været mest almindelig udbredt, paa Byggen mere spredt,
{ men Angrebene vare her mere voldsomme. Roernes Forringelse er uvæsentlig.

Det er særlig paa Egnens ringeste Jorder, at Skaden er størst og vurderes til $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$.

Havren giver kun ringe Udbytte, men i hvor høj Grad dette skyldes Larveangreb
kan ikke siges.

Roer, saaede sidst i Maj og først i Juni, er de fleste Steder helt ødelagte. Bælg-
sæden har været stærkt angreben af Jordløpper.

Fritfluen er ikke optraadt her. Skaden paa Roerne skyldes mest Knoporm, om end
enkelte Afrøder ødelagdes helt af Kaalmøllen.

Landboforening	Høstudbyttets Førringelse paa Grund af Larveangreb anslaaes til (pCt.)			
	Byg	Havre	Kaalroer	Turnips
Aalborg Amt:	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Aalborg Amts Lbf.....	—	66	"	"
Hobro-Aalestrup og Omegns Lbf....	—	66	—	—
Nibe-Løgstør og Omegns Lbf.....	"	—	—	"
Hjørring Amt:				
Hjørring Amts Lbf.....	"	25—33	17	
Landboforeningen Vendsyssel.....	—	50	25	
Læsø Lbf.....	"	33	25	
Han Herredernes Lbf.....	"	33	—	—
Thisted Amt:				
Thylands landøkonomiske Selskab.....	"	—	20	
Landboforeningen «Nordthy».....	"	10	33	
Morsø Lbf.....	14	20	25	33
Sejerslev-Ejerslev-Jordsby Kommunes Lbf.	"	"	"	"
Viborg Amt:				
Viborg Amts landøkonomiske Forening ...	"	50	25	
Salling Lbf.....	"	under 25	"	"
Langaa og Omegns Lbf.....	"	25—75	"	"
Kjellerup og Omegns Lbf.....	"	75	25	
Ringkøbing Amt:				
Skodborg-Vandfuld Herreders Lbf.....	"	12	17	
Hjerm-Ginding Herreders Lbf.....	"	50—100	10—15	"
Hedelandboforeningen for Feldborg og Omegn	"	50—66	20	
Ulfborg-Hind Herreders Lbf.....	"	—	—	"
Hammerum Herreds Lbf.....	10	50—80	"	"
Sunds, Simmelkær Ildskov og Omegns Lbf.	"	50	—	—
Vildbjerg og Omegns Lbf.....	"	50	"	"
Bølling-Nørre Herreders Lbf.....	"	75	"	"
Vorgod-Brejning m. fl. Sognes Lbf.....	—	33	"	"
Ribe Amt:				
Kolding Omegns Lbf.....	12	25	25	25
Kolding Vesteregns Lbf.....	—	33—50	"	"
Slaugs Herreds og Omegns Lbf.....	"	33	"	"
Øster Herreds Lbf.....	"	—	—	"
Nørre-Nebel og Omegns Lbf.....	"	33	"	"
Bramminge Omegns Lbf.....	"	"	"	"
Esbjerg og Omegns Lbf.....	"	33	20	"
Fanø Lbf.....	"	25	12	"
Ribe Amts nordre Lbf.....	"	33	"	"
Ribe og Omegns Lbf.....	"	20	"	"

Anmærkninger

{ Havren er angreben saa godt som over hele Amtet, Byggen kun spredt, særlig paa lave Jorder.
 { Havren, særlig den hvide, er meget stærkt angreben, Byggen mindre. Roernes Forringelse skyldes Knoporm.

{ Angrebene paa Byggen have været spredte og ere uvæsentlige, paa Havren næsten overalt, mest i Landsdelens midterste og østlige Egne; det samme gælder Roemarkerne.

Skaden paa Havren er ubetydelig (næppe over 2 pCt.).

Skaden har været ubetydelig.

{ Skaden er noget ulige fordelt, mange Steder er der slet ingen Havreavl, men hertil er Tørken medvirkende. Paa Rodfrugterne er Skaden end mere uens, mange Afgrøder ere udmærkede, mange give kun halvt Udbytte, enkelte ere helt ødelagte.
 { Skaden er meget forskellig. Af Havren er de fleste Steder kun den halve Plantebestand tilbage. Roerne have som Helhed ikke taget saa stor Skade; 10 pCt. er helt ødelagt, 60 pCt. giver en god Høst.
 { Skaden paa Havren ligger mellem 33 og 90 pCt. af normal Høst. Paa Roerne ligger Skaden mellem intet Tab og fuldstændig Ødelæggelse.

{ Skaden paa Roerne er bedømt under Hensyn til, at Udbyttet iaar ellers maatte forventes at blive meget stort, nu normalt.
 { Det er særlig gul Havre, navnlig paa lettere Jorder og Mosebund i Foreningens sydligste Omraade, der har lidt mest. Kaalmøllen har næppe gjort stor Skade, derimod Smeldelarver og Knoporm.

{ Høstudbyttet af hvid Havre er ofte gaaet ned til det halve og er mange Steder helt mislykket. Kaalroerne have til Dels forvundet Skaden.
 { Den graa Havre forringet med 50 pCt., den gule med 80 pCt. Om Roerne udtales, at det gunstige Vejr i Eftersommeren fuldstændig har genoprettet Møllarvens Angreb, saa at Udbyttet bliver udmærket.
 For Roernes Vedkommende skyldes Skaden Kaalbroksvampen.

{ Høstudbyttet af Havre er næppe over $\frac{1}{4}$ af det sædvanlige. Roerne have vel nok været stærkt angrebne af Kaalmøl, men Udbyttet vil næppe være under det normale.
 { Byggen har enkelte Steder lidt Skade. Særlig den graa Havre har her været angreben. Det er især Fritfluen, Skaden skyldes, men ogsaa Stankelbenlarven.
 { Forringelsen ligger mellem 0 og $\frac{5}{16}$; men det maa bemærkes, at Høstudbyttet som Helhed, trods Reduktionen, næppe ligger langt under det normale paa Grund af de gode Vækstbetingelser.

{ Skaden paa Havren er størst for den gule Havre. Skaden paa Kaalroer er spredt og skyldes Kaalbroksvampen.

Roerne have været angrebne, men ventes at give Middelhøst.

{ Samtlige Havremarker have her været angrebne, nogle Kaalroemarker ret stærkt, andre uden Betydning.
 90 pCt. af samtlige Havremarker have været angrebne, 15 pCt. ere helt ødelagte. Roerne ventes at ville give Middelhøst trods Angreb af Kaalmøllen.

en Tredjedel, og for de fleste Egne gælder det, at Sommerens fortrinlige Vækstbetingelser bødede paa den litte Skade. Larverne angreb væsentligst Kaalroer og Turnips, derimod slet ikke eller dog kun i ringe Grad Runkelroerne. Da de førstnævnte Rodfrugter arter fortrinsvis dyrkes i Jylland, er det denne Landsdel, der mest har lidt under Larveangreb paa Roemarkerne.

Paa Grundlag af de i det foregaaende meddelte Oplysninger kan Høsten i 1905 karakteriseres saaledes:

For Landet som Helhed var det samlede Høstudbytte — navnlig hvad Kvaliteten angaar — i hvert Fald ikke under Middelhøst. Men der var en meget betydelig Forskel saavel mellem de enkelte Afgrøder som mellem de forskellige Landsdele. Af Kornafgrøderne maa Vintersædens (især Rugens) Udbytte i de fleste Egne betegnes som langt over Middelhøst, medens Foraarsæden, og da især Havren, gennemgaaende har givet langt under Middelhøst. Af Rodfrugterne gav Kaalroer og Turnips nærmest et Middeludbytte, Runkelroer i de fleste Egne langt derover. Gennemgaaende var Høstudbyttet mere tilfredsstillende paa Øerne end i Jylland; dog brydes denne Hovedregel paa den ene Side af Bornholm, hvor navnlig Vaarsædens Udbytte var tarveligt, paa den anden Side af Halvøens sydlige Del (navnlig Vejle Amt), der hører til de gunstigere Egne af Landet. — Et for Høsten 1905 særlig karakteristisk Træk er det, at den uheldige Indflydelse saa vel af Vejrlig som af Insekt- og Larveangreb ikke alene har ramt de enkelte Afgrøder og de forskellige Landsdele i højst ulige Omfang, men at ogsaa inden for samme Egn enkelte Landbrug have lidt Tab paa denne eller hin Afgrøde i langt højere Grad, end man faar Indtryk af ved at betragte de foranstaaende almindelige Oversigter.
