

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

2013:9 • 12. december 2013

Sygehusbenyttelse 2012

Resumé: I alt 642.447 personer var i 2012 indlagt en eller flere gange på et sygehus. Det svarer til 11,5 pct. af befolkningen. Der var i alt 1.239.128 indlæggelser på de offentlige somatiske sygehuse i 2012 og det samlede antal sengedage var på 4.102.889. Hertil kommer 7.058.551 ambulante behandlinger givet til 1.595.436 ambulante patienter. En større del patienter er både indlagt og modtager ambulante behandling. De nævnte tal omfatter kun personer, der havde bopæl i Danmark 1. januar 2012.

Kort om statistikken: Statistikken belyser befolkningens indlæggelser og ambulante behandlinger på offentlige somatiske sygehusafdelinger i et kalenderår. Statistikken er baseret på Landspatientregistret fra Statens Serum Institut kombineret med en række baggrundsoplysninger fra andre registre. Det vises f.eks. hvordan sygehusforbruget varierer med en række forhold som familie, uddannelse, erhverv, bolig, herkomst og geografi efter standardisering for køn og alder. Det er første gang tabeller med ambulante behandlinger præsenteres i denne efterretning.

1. Oversigt

11,5 pct. af befolkningen var indlagt og 28,6 pct. modtog ambulante behandling

I alt 642.447 personer var i 2012 indlagt en eller flere gange på et sygehus. Det svarer til 11,5 pct. af befolkningen, jf. oversigtstabel 1 nedenfor. I alt 1.595.436 personer modtog i 2012 ambulante behandling en eller flere gange på et sygehus. Det svarer til 28,6 pct. af befolkningen, jf. oversigtstabel 2 nedenfor. Alle diagnoser er medtaget, dvs. også indlæggelser i forbindelse med graviditet og fødsel. Hvis man medtager personer der er født eller indvandret i løbet af året var 701.937 personer indlagt i 2012 og 1.651.871 modtog ambulante behandling, jf. tabel 1 og 2 s. 11.

Oversigtstabel 1.

Indlagte personer¹ og indlæggeshyppigheder fordelt på køn og alder. Alle diagnoser. 2012

	Mænd		Kvinder		I alt	
	Indlagte personer	Indlæggeshyppighed	Indlagte personer	Indlæggeshyppighed	Indlagte personer	Indlæggeshyppighed
	antal	pct.	antal	pct.	antal	pct.
I alt 2012	280 423	10,1	362 024	12,9	642 447	11,5
1-4 år	17 830	13,7	13 544	11,0	31 374	12,4
5-14 år	17 596	5,2	14 611	4,5	32 207	4,9
15-24 år	19 346	5,3	30 912	8,9	50 258	7,1
25-34 år	16 971	5,2	60 578	18,8	77 549	12,0
35-44 år	24 055	6,3	44 085	11,7	68 140	9,0
45-54 år	34 134	8,4	37 364	9,4	71 498	8,9
55-64 år	43 080	12,4	39 893	11,4	82 973	11,9
65-74 år	53 992	18,3	49 343	15,9	103 335	17,1
75-84 år	37 161	27,6	42 321	24,7	79 482	26,0
85+ år	16 258	37,8	29 373	32,7	45 631	34,4

¹ I tabellen er kun medtaget personer, der havde bopæl i Danmark 1. januar 2012. Dvs. at personer født eller indvandret i løbet af året ikke er medtaget i tabellen.

Størst andel blandt kvinderne

For kvinderne var det 12,9 pct. og for mændene 10,1 pct. af befolkningen, der var indlagt, når der ses på alle diagnoser. 31,9 pct. af kvinderne modtog ambulante behandlinger, mens det for mændenes vedkommende var 25,2 pct.

Kvindernes højere andel skyldes mange indlæggelser især i aldersgruppen 25-34 år, jf. oversigtstabel 1. Hovedparten af disse indlæggelser er sket i forbindelse med graviditet, fødsel og abort. Når der ses bort fra sådanne indlæggelser, er kvindernes indlæggeshyppighed nærmest på niveau med mændenes.

Oversigtstabel 2. **Personer med ambulat behandling¹ og behandlingshyppigheder fordelt på køn og alder. Alle diagnoser. 2012**

	Mænd		Kvinder		I alt	
	Ambulante patienter	Behandlingshyppighed	Ambulante patienter	Behandlingshyppighed	Ambulante patienter	Behandlingshyppighed
	antal	pct.	antal	pct.	antal	pct.
I alt 2012	697 152	25,2	898 284	31,9	1 595 436	28,6
1-4 år	24 983	19,2	18 999	15,4	43 982	17,3
5-14 år	51 899	15,3	46 084	14,2	97 983	14,8
15-24 år	55 993	15,4	77 940	22,5	133 933	18,9
25-34 år	52 734	16,2	122 770	38,2	175 504	27,1
35-44 år	73 429	19,2	118 722	31,4	192 151	25,3
45-54 år	97 591	24,1	124 309	31,3	221 900	27,6
55-64 år	114 970	33,0	128 744	36,6	243 714	34,8
65-74 år	130 682	44,4	136 524	44,1	267 206	44,2
75-84 år	72 959	54,1	85 926	50,1	158 885	51,9
85+ år	21 912	50,9	38 266	42,7	60 178	45,3

¹Jf. note 1 i oversigtstabel 1.

1,2 mio. indlæggelser og
7 mio. ambulante
behandlinger

I alt var de 642.447 personer indlagt mere end 1,2 mio. gange, eller i gennemsnit 1,9 gange. Det gennemsnitlige antal indlæggelser stiger jævnt med alderen, jf. oversigtstabel 3. 1,6 mio. personer modtog ambulat behandling, som der blev givet mere end 7 mio. af i 2012. Det gennemsnitlige antal ambulante behandlinger pr. person var 4,4, jf. oversigtstabel 4.

Oversigtstabel 3. **Indlæggelser¹ fordelt på køn og alder. Alle diagnoser. 2012**

	Mænd		Kvinder		I alt	
	Indlæg-gelser	Gnsntl. antal indlægg.	Indlæg-gelser	Gnsntl. antal indlægg.	Indlæg-gelser	Gnsntl. antal indlægg.
	antal					
I alt 2012	576 747	2,1	662 381	1,8	1 239 128	1,9
1-4 år	30 245	1,7	22 701	1,7	52 946	1,7
5-14 år	27 071	1,5	23 603	1,6	50 674	1,6
15-24 år	29 444	1,5	48 025	1,6	77 469	1,5
25-34 år	26 558	1,6	86 052	1,4	112 610	1,5
35-44 år	40 674	1,7	68 180	1,5	108 854	1,6
45-54 år	66 279	1,9	66 043	1,8	132 322	1,9
55-64 år	94 139	2,2	78 999	2,0	173 138	2,1
65-74 år	127 470	2,4	104 494	2,1	231 964	2,2
75-84 år	93 951	2,5	96 914	2,3	190 865	2,4
85+ år	40 916	2,5	67 370	2,3	108 286	2,4

¹ I tabellen er kun medtaget indlæggelser af personer, der havde bopæl i Danmark 1. januar 2012. Dvs. at indlæggelser af personer født eller indvandret i løbet af året ikke er medtaget i tabellen.

Oversigtstabel 4. Ambulante behandlinger¹, fordelt på køn og alder. Alle diagnoser. 2012

	Mænd		Kvinder		I alt	
	Ambulante behandlinger	Gnsntl. antal behandlinger	Ambulante behandlinger	Gnsntl. antal behandlinger	Ambulante behandlinger	Gnsntl. antal behandlinger
	— antal —					
I alt 2012	3 005 042	4,3	4 053 509	4,5	7 058 551	4,4
1-4 år	62 453	2,5	47 824	2,5	110 277	2,5
5-14 år	133 602	2,6	124 197	2,7	257 799	2,6
15-24 år	155 695	2,8	284 807	3,7	440 502	3,3
25-34 år	160 654	3,0	698 877	5,7	859 531	4,9
35-44 år	250 618	3,4	538 289	4,5	788 907	4,1
45-54 år	391 659	4,0	505 547	4,1	897 206	4,0
55-64 år	560 436	4,9	575 329	4,5	1 135 765	4,7
65-74 år	749 176	5,7	680 268	5,0	1 429 444	5,3
75-84 år	430 769	5,9	441 054	5,1	871 823	5,5
85+ år	109 980	5,0	157 317	4,1	267 297	4,4

¹ Jf. note 1 i oversigtstabel 3.

4,1 mio. sengedage

De 642.447 personer, der var indlagt i 2012 havde i alt været indlagt i 4,1 mio. dage, hvilket svarer til 6,4 dage i gennemsnit, jf. oversigtstabel 5. Mænds gennemsnitlige sengedagsforbrug er 1,1 dage højere end kvindernes, men frem til ca. 25-årsalderen er der ikke den store forskel i det gennemsnitlige sengedagsforbrug for mænd og kvinder. Fra 25 års alderen har mændene det højeste gennemsnitlige sengedagsforbrug. Størst er forskellen for de 55-74 årige.

Oversigtstabel 5. Sengedage¹, fordelt på køn og alder. Alle diagnoser. 2012

	Mænd		Kvinder		I alt	
	Sengedage	Gnsntl. antal sengedage	Sengedage	Gnsntl. antal sengedage	Sengedage	Gnsntl. antal sengedage
	— antal —					
I alt 2012	1 970 982	7,0	2 131 907	5,9	4 102 889	6,4
1-4 år	56 661	3,2	45 535	3,4	102 196	3,3
5-14 år	48 693	2,8	44 141	3,0	92 834	2,9
15-24 år	62 287	3,2	96 018	3,1	158 305	3,1
25-34 år	61 993	3,7	201 415	3,3	263 408	3,4
35-44 år	106 321	4,4	165 351	3,8	271 672	4,0
45-54 år	202 197	5,9	182 112	4,9	384 309	5,4
55-64 år	341 673	7,9	265 317	6,7	606 990	7,3
65-74 år	505 425	9,4	399 258	8,1	904 683	8,8
75-84 år	404 357	10,9	422 899	10,0	827 256	10,4
85+ år	181 375	11,2	309 861	10,5	491 236	10,8

¹ I tabellen er kun medtaget sengedage for personer, der havde bopæl i Danmark 1. januar 2012. Dvs. at sengedage for personer født eller indvandret i løbet af året ikke er medtaget i tabellen.

Oversigtstabel 6. Ambulante behandlinger, indlæggelser, patienter og sengedage. Alle diagnoser.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	— tusinde —						
Ambulante behandlinger	5 715	5 854	5 807	6 339	6 541	6 800	7 059
Ambulante patienter	1 399	1 421	1 413	1 493	1 529	1 560	1 595
Indlæggelser	1 087	1 097	1 084	1 157	1 197	1 208	1 239
Indlagte patienter	616	621	609	637	645	643	642
Sengedage	4 702	4 612	4 553	4 481	4 281	4 126	4 103

Færre sengedage og flere ambulante behandlinger

I perioden 2006-2012 er antallet af sengedage faldet 12,7 pct. fra 4,7 mio. til 4,1 mio., mens antallet af ambulante behandlinger i samme periode er steget med 23,5 pct., jf. oversigtstabel 6.

Tabeloversigt

<i>Diagnoser</i>	1	Indlagte personer fordelt efter køn og udskrivningsdiagnose.....	13
	2	Personer med ambulante behandling fordelt efter køn og udskrivningsdiagnose	13
	3A	Indlagte mænd procentvis fordelt efter alder og udskrivningsdiagnose.....	14
	3B	Indlagte kvinder procentvis fordelt efter alder og udskrivningsdiagnose	14
	4A	Mænd med ambulante behandling fordelt efter alder og udskrivningsdiagnose	16
	4B	Kvinder med ambulante behandling fordelt efter alder og udskrivningsdiagnose	16
<i>Område</i>	5A	Indeks for indlagte patienter fordelt efter region og landsdel. Mænd	18
	5B	Indeks for indlagte patienter fordelt efter region og landsdel. Kvinder	18
	6A	Indeks for ambulante patienter fordelt efter region og landsdel. Mænd	20
	6B	Indeks for ambulante patienter fordelt efter region og landsdel. Kvinder.....	20
	7A	Indeks for gns. sengedagsforbrug fordelt efter region og landsdel. Mænd.....	22
	7B	Indeks for gns. sengedagsforbrug fordelt efter region og landsdel. Kvinder	22
	8A	Indeks for gns. antal ambulante behandlinger fordelt på region mv. Mænd	24
	8B	Indeks for gns. antal ambulante behandlinger fordelt på region mv. Kvinder.....	24
<i>Familietype</i>	9	Indeks for indlagte patienter fordelt efter familietype og køn	26
	10	Indeks for ambulante patienter fordelt efter familietype og køn	26
	11	Indeks for gns. sengedagsforbrug fordelt efter familietype og køn	27
	12	Indeks for gns. antal ambulante behandlinger fordelt efter familietype og køn	27
<i>Socioøkonomisk status</i>	13A	Indeks for indlagte patienter fordelt efter socioøkonomisk status. Mænd.....	28
	13B	Indeks for indlagte patienter fordelt efter socioøkonomisk status. Kvinder	28
	14A	Indeks for ambulante patienter fordelt efter socioøkonomisk status. Mænd.....	29
	14B	Indeks for ambulante patienter fordelt efter socioøkonomisk status. Kvinder	29
	15	Indeks for indlagte børn fordelt efter familiens socioøkonomisk status.....	30
	16	Indeks for børn der modtager ambulante beh. fordelt efter socioøk. status.....	30
	17A	Indeks for gns. sengedagsforbrug for mænd efter socioøkonomisk status. Mænd.....	31
	17B	Indeks for gns. sengedagsforbrug for mænd efter socioøkonomisk status. Kvinder....	31
	18A	Indeks for gns. antal ambulante behandlinger efter socioøk. Mænd.....	32
	18B	Indeks for gns. antal ambulante behandlinger efter socioøk. Kvinder	32
<i>Uddannelse</i>	19A	Indeks for indlagte patienter fordelt efter uddannelse. Mænd	33
	19B	Indeks for indlagte patienter fordelt efter uddannelse. Kvinder	33
	20A	Indeks for ambulante patienter fordelt efter uddannelse. Mænd.....	34
	20B	Indeks for ambulante patienter fordelt efter uddannelse. Kvinder	34
	21A	Indeks for indlagte patienter fordelt efter familiens uddannelse. Drengene	35
	21B	Indeks for indlagte patienter fordelt efter familiens uddannelse. Piger	35
	22A	Indeks for ambulante patienter fordelt efter familiens uddannelse. Drengene	36
	22B	Indeks for ambulante patienter fordelt efter familiens uddannelse. Piger	36
	23A	Indeks for gns. sengedagsforbrug fordelt efter uddannelse. Mænd	37
	23B	Indeks for gns. sengedagsforbrug fordelt efter uddannelse. Kvinder.....	37
<i>Bolig</i>	24A	Indeks for gns. antal ambulante beh. fordelt efter uddannelse. Mænd	38
	24B	Indeks for gns. antal ambulante beh. fordelt efter uddannelse. Kvinder.....	38
	25	Indeks for indlagte patienter fordelt efter boligtype og køn	39
	26	Indeks for ambulante patienter fordelt efter boligtype og køn	39
<i>Herkomst</i>	27	Indeks for gns. sengedagsforbrug fordelt efter boligtype og køn	40
	28	Indeks for gns. antal ambulante behandlinger fordelt på boligtype og køn.....	40
	29	Indeks for indlagte patienter fordelt efter herkomst og køn	41
	30	Indeks for ambulante patienter fordelt efter herkomst og køn	41
	31	Indeks for gns. sengedagsforbrug fordelt efter herkomst og køn	42
	32	Indeks for gns. antal ambulante behandlinger fordelt på herkomst og køn	42

2. Diagnose

87.000 indlagt med sygdomme i kredsløbsorganer

I tabel 1 er alle indlagte personer (inkl. personer, der er født eller indvandret i løbet af året) fordelt efter diagnose. Diagnosen er grupperet i henhold til kapitler i den såkaldte S-liste (udvidet med gruppen "Levendefødte"). For mændene er de største diagnosegrupper "Sygdomme i kredsløbsorganer" (16 pct.), "Traumer og forgiftninger" (14 pct.) og "Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande" (29 pct.). For kvinderne er de største diagnosegrupper - når bortses fra "Sygdomme i svangerskab og under fødsel" - ligeledes "Sygdomme i kredsløbsorganer" (10 pct.), "Traumer og forgiftninger" (11 pct.) og "Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande" (25 pct.). Diagnosegruppen "Traumer og forgiftninger" dækker over en række diagnoser som knoglebrud, hjernerystelse uden kraniebrud, åbent sår og vævssønderrivning samt skadelige virkninger af kemiske stoffer. Skadelige virkninger af kemiske stoffer kan fx være fejlagtig medicinindtagelse.

Hvad angår personer, der modtager ambulante behandling, jf. tabel 2, er der (udover "Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande") flest patienter, som behandles for "Sygdomme i nervesystem og sanseorganer" (15 pct.) og "Sygdomme i knogler, bevægelsessystem og bindevæv" (18 pct.).

Små børn indlægges ofte med sygdomme i åndedrætsorganer

I tabel 3 A og 3 B er henholdsvis mænd og kvinder yderligere fordelt på alder (de 0-årige er ikke medtaget i tabellen, da næsten 100 pct. af disse var indlagt med diagnosen "Levendefødt"). Af de 1-4-årige indlagte drenge og piger var henholdsvis 34 pct. og 29 pct. indlagt med diagnosen "Sygdomme i åndedrætsorganer". For de 10-14-årige er der 24 pct. af drengene og 19 pct. af pigerne, der var indlagt med diagnosen "Traumer, forgiftninger og anden voldelig legemsbeskadigelse". For mænd på 55 år og derover er "Sygdomme i kredsløbsorganer" en hyppig diagnose – mellem 22 og 29 pct. var indlagt med den. For kvinderne i den tilsvarende aldersgruppe er der ligeledes en relativt stor andel (mellem 12 og 24 pct.) af de indlagte, der har haft denne diagnose.

En fjerdedel af de ambulante kvindelige patienter mellem 50-79 år behandles for "Sygdomme i knogler, bevægelsessystem og bindevæv". De mere end 80 årige behandles ambulante især for "Sygdomme i nervesystem og sanseorganer", jf. tabel 4 A og 4 B.

3. Forklaring til tabeller med indeks

En måde at belyse sammenhængen mellem sygehusforbrug og sociale forhold er at se på, hvor mange i en befolkningsgruppe der er indlagt eller i ambulante behandling afhængig af personers sociale karakteristika.

En anden måde at belyse sammenhængen mellem sygehusforbrug og sociale forhold er at se på, hvordan sengedagsforbruget eller antallet af ambulante behandlinger varierer med de indlagte eller ambulante patienters sociale karakteristika.

Resultatet er vist som indekstal, og der er kun medtaget personers indlæggelser og ambulante behandlinger i forbindelse med egentlig sygdom.

Tabellerne 9-31 er præsenteret med indeks efter at tallene er standardiserede, dvs. der er korrigeret for at køn- og aldersfordelingen ikke er ens for de forskellige grupper der opgøres på. Dermed er det muligt at sammenligne på tværs af grupperne inden for hvert køn.

Gennemsnittet for mænd hhv. kvinder i hver aldersgruppe er for de fleste tabellers vedkommende sat til 100. Dog er fx tabellerne opdelt på socioøkonomisk status opgjort, så alle mænd hhv. kvinder i arbejdsstyrken, 20-64 år er sat lig med 100. Indeks for mænd er ikke umiddelbart sammenlignelig med indeks for kvinder.

For også at kunne beskrive børns sygehusforbrug i relation til forældrenes sociale karakteristika er der lavet specifikke tabeller for børn efter familiens socioøkonomiske status og familiens uddannelse. Dvs. disse tabeller er adskilt på voksen-niveau og for børn.

Ved fortolkning af tabellerne gælder det, at indeks over 100 svarer til en større andel af indlæggelser (eller ambulante behandlinger, gennemsnitlig sengedage, gennemsnitlige ambulante behandlinger) end gennemsnittet for det pågældende køn i den givne aldersgruppe.

Man skal samtidig være opmærksom på, at der i enkelte celler kan være større udsving uden det kan give anledning til markante konklusioner. Dette kan være tilfældet, når populationen i den enkelte celle er af begrænset størrelse.

For hvert tema (familietype, socioøkonomisk status, uddannelse, bolig og herkomst) findes som udgangspunkt fire tabeller:

1. Indeks for indlagte patienter (andel af hhv. mænd og kvinder indlagt)
2. Indeks for ambulante patienter (andel af hhv. mænd og kvinder, som har modtaget ambulante behandling)
3. Indeks for gennemsnitlig sengedagsforbrug pr. indlagt patient
4. Indeks for gennemsnitlig antal ambulante behandlinger pr. ambulante patient.

I de tabeller, hvor mænd og kvinder præsenteres særskilt er tabellen delt op i to dele (A og B).

Når der i tabellerne med indeks er anført to prikker i en tabelcelle, angiver det, at der er færre end 50 indlagte personer i den pågældende aldersgruppe.

Ved standardiseringen er anvendt den officielle metode i Danmarks Statistik til at standardisere ved hjælp af den af Metodeenheden udviklede makro.

4. Regioner og landsdele

I tabel 5 A og 5 B angives hvor stor andel af befolkningen fordelt på regioner og landsdele, der er indlagt for henholdsvis mænd og kvinder. I tabel 6 A og 6 B angives andelen af befolkningen, som har modtaget ambulante behandling. Værdierne er udtrykt ved indeks, dvs. at tal under 100 angiver en hyppighed, der ligger under gennemsnittet for hele landets mænd eller kvinder og tal over 100 en hyppighed, der ligger over.

Små børn hyppigt indlagt i landsdelen Københavns Omegn

For børn i alderen 1-4 år ligger indlæggelseshyppighederne i landsdelen Vest- og Sydsjælland 16-17 pct. over landsgennemsnittet, mens landsdelen Østjylland har de laveste indlæggelseshyppigheder for de 1-4 årige børn. Både mænd og kvinder på 45 år og derover i landsdelen Københavns by har indlæggelseshyppigheder, der ligger over gennemsnittet for hele landet. (Dette er også tilfældet i andre landsdele.) Omvendt har de 20-34-årige i denne landsdel indlæggelseshyppigheder, der er blandt de laveste i landet. Betragtes regionerne under ét, så har region Sjælland og region Hovedstaden indlæggelseshyppigheder over landsgennemsnittet og regionerne Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland har hyppigheder under landsgennemsnittet.

Hvad angår de ambulante behandlinger, så ligger region Sjælland og region Hovedstaden sammen med region Nordjylland under gennemsnittet, mens region Syddanmark har behandlingshyppigheder, som ligger 15 pct. over gennemsnittet både for mænd og kvinder.

Sengedagsforbrug

I tabel 7 A og 7 B er det gennemsnitlige sengedagsforbrug for indlagte henholdsvis mænd og kvinder fordelt på alder, regioner og landsdele. Som nævnt er kun medtaget sengedagsforbrug i forbindelse med egentlig sygdom. Personer på Bornholm har et

gennemsnitligt sengedagsforbrug, der ligger omkring 15 pct. (for mænd) og 22 pct. (for kvinder) over landsgennemsnittet. Det laveste sengedagsforbrug findes for både mænd og kvinder i landsdelen Vestjylland med 11 pct. under gennemsnittet (indeks 89). Landsdelen Vestjylland ligger også lavt med hensyn til det gennemsnitlige antal ambulante behandlinger, jf. tabel 8 A og 8 B.

5. Sociale forhold og sygehusforbrug

I det følgende præsenteres en række aldersstandardiserede opgørelser, hvor sygehusforbrugets variation med udvalgte baggrundsoplysninger illustreres. De udvalgte baggrundsoplysninger er familietype, socioøkonomisk status, uddannelse, bolig og herkomst. Tabellerne omfatter kun personer, der har været indlagt med en sygdomsdiagnose.

Vigtigste sociale forhold Tidligere analyser har vist, at den socioøkonomiske gruppering har den største selvstændige betydning for de voksnes sygehusforbrug. For børnenes vedkommende er det familiens uddannelsesniveau, der har den største betydning.

Familietype Tabel 9 viser indeks for indlagte patienter (tidligere benævnt som de aldersbetingede indlæggelseshyppigheder) og angiver hvor stor en andel af en given befolkningsgruppe, der har været indlagt i forhold til gennemsnittet på 100 for hhv. mænd og kvinder, i dette tilfælde fordelt på familietype Børn optræder i den familietype, som de bor i. Enlige mænd - især i alderen 35-64 år er indlagt væsentligt oftere end gennemsnittet, mens det modsatte (om end ikke lige så udtalt) er tilfældet for de gifte mænd. Det samme billede tegner sig for de enlige og de gifte kvinder.

Forskellene mellem familietype er ikke nær så udtalte, når der ses på andelen af ambulante patienter, jf. tabel 10. I tabel 11 vises det gennemsnitlige sengedagsforbrug pr. indlagt patient, og for især mænd men også kvinder, kan det ses, at enliges sengedagsforbrug ligger en del højere end gennemsnittet. Samme billede tegner sig om end i langt svagere grad, hvad angår det gennemsnitlige antal ambulante behandlinger pr. patient, jf. tabel 12.

Det har tidligere vist sig, at forskellen mindskes noget, hvis der også korrigeres for den socioøkonomiske sammensætning.

Børn, der lever hos et ægtepar, har hyppigheder, der ligger lidt under gennemsnittet. Særligt iøjnefaldende er det, at de 1-4 årige drenge og piger, der bor hos et samboende par, har hyppigheder, der ligger henholdsvis op i mod 50 pct. over gennemsnittet. En nærmere analyse af disse tal har tidligere vist, at det især er de 1-årige børn hos samboende par, der har høje hyppigheder. Dette skal imidlertid tolkes med varsomhed, idet oplysningen om familietype for netop de 1-årige ikke i alle tilfælde afspejler de faktiske forhold. Dette skyldes, at der i CPR-systemet kan gå et par måneder inden henvisningen til faderen er på plads. Da gruppen af 1-årige, der bor hos et samboende par er relativt lille i forhold til gruppen af 1-årige, der bor hos et samlevende par vil en ændring af familietype fra samboende til samlevende for blot nogle få børn betyde et relativt stort fald i indlæggelseshyppigheden for de samboende, men kun en lille stigning for de samlevende.

Socioøkonomisk status Indeks for indlagte patienter fordelt efter socioøkonomisk status er vist i tabel 13 A og 13 B. I disse tabeller er det gennemsnittet for *alle i arbejdsstyrken*, der er sat til 100. Dvs. at indlæggelseshyppighederne for personer uden for arbejdsstyrken ikke indgår i det beregnede gennemsnit. Tabel 13 A viser, at mandlige lønmodtagere på højeste niveau ligger betydeligt under gennemsnittet for andel indlagte. Også toplederne, lønmodtagerne på mellemniveau og uddannelsessøgende ligger generelt under gennemsnittet. Hos lønmodtagere på grundniveau og øvrige lønmodtagere ligger andelen en smule over gennemsnittet for arbejdsstyrken. Arbejdsløse mænd samt mænd udenfor arbejdsstyrken (ekskl. uddannelsessøgende) er indlagt i væsentlig højere grad end gennemsnittet for alle i arbejdsstyrken. For kvinderne tegner der sig

det samme mønster. Når der ses på andel af befolkningen med ambulante behandlinger er det tilsvarende billede gældende men ikke helt så udtalt, jf. tabel 14 A og 14 B.

I tabel 17 A og 17 B er det gennemsnitlige sengedagsforbrug i året vist for henholdsvis mænd og kvinder i relation til socioøkonomisk status. For både mænd og kvinder gælder det, at pensionister (20-64 år), kontanthjælpsmodtagere, personer midlertidigt ude af arbejdsstyrken og øvrige uden for arbejdsstyrken i alle aldersgrupper har et gennemsnitligt sengedagsforbrug, der ligger væsentligt over gennemsnittet for alle i arbejdsstyrken. Det laveste sengedagsforbrug ses hos topledere både for mænd og kvinder.

I tabel 15 og 16 er der set på hvor ofte børn er indlagt eller modtager ambulante behandlinger i relation til familiens socioøkonomiske status. Familiens socioøkonomiske status er defineret som den socioøkonomiske status for den voksne person i familien, der har den største personindkomst. Det billede, der tegner sig for børnenes hyppigheder i relation til familiens socioøkonomiske status, er stort set tilsvarende (om end ikke så udtalt) det billede, der fremgik for de 20-64-årige i tabel 13 og 14. Børn, der bor i familier, hvor den socioøkonomiske status er lønmodtager på mellemniveau og grundniveau samt andre lønmodtagere har et sygehusforbrug, der ligger tæt på gennemsnittet. Børn, der lever i familier med socioøkonomisk status pensionist (20-64 år), kontanthjælpsmodtager eller midlertidigt ude af arbejdsstyrken ligger højt over gennemsnittet.

Uddannelse Sammenhængen mellem uddannelse og indlæggelseshyppighed er vist i tabel 19 A og 19 B. Både for mændene og for kvinderne gælder det generelt, at jo højere uddannelse man har, jo lavere er indlæggelseshyppigheden. Dog har personer med en gymnasial uddannelse lavere hyppigheder end personer, der har en erhvervsfaglig uddannelse. Personer med alene grundskoleuddannelse (eller uoplyst) har - uanset alder - indlæggelseshyppigheder, der ligger over gennemsnittet. Forskellene er ikke så udtalte, når der ses på det gennemsnitlige sengedagsforbrug, jf. tabel 23 A og 23 B, og de er endnu mindre udtalte ved det gennemsnitlige antal ambulante behandlinger, jf. tabel 24 A og 24 B.

Tidligere er det vist, at det for alle uddannelsestyper gælder, at hvis der også standardiseres for den socioøkonomiske gruppering, så forsvinder forskellene stort set.

I tabel 21 A og 21 B er børnenes sygehusforbrug set i sammenhæng med familiens uddannelse. Familiens uddannelse er defineret som uddannelsen for den voksne person i familien, der har den højeste uddannelse. Tabellerne viser stort set det samme mønster, som fremgik af tabellerne for voksne Børn, der bor i familier uden erhvervsuddannelse har indlæggelseshyppigheder langt over gennemsnittet, og børn, der bor i familier med en videregående uddannelse har indlæggelseshyppigheder, der ligger under gennemsnittet. Til gengæld er billedet mindre entydigt hvad angår de ambulante patienters behandlinger i relation til familiens uddannelse, jf. tabel 22 A og 22 B.

Boligtype I tabel 25 er indlæggelseshyppighederne vist i relation til den type af bolig, personen bor i. Personer, der bor i et enfamiliehus, har generelt hyppigheder under gennemsnittet, mens personer, der bor i rækkehuse eller etageboliger har hyppigheder over gennemsnittet. Denne forskel er mindre tydelig, når der ses på andelen af personer, der modtager ambulante behandlinger, jf. tabel 26.

Når man ser på det gennemsnitlige antal sengedage, jf. tabel 27, samt det gennemsnitlige antal ambulante behandlinger, jf. tabel 28, så er det fortsat etageboliger der ligger over gennemsnittet og enfamiliehuse der ligger under. Der ses bort fra øvrige boligtyper, da den boligtype kan have mere uhomogen sammensætning.

Herkomst I tabel 29-32 vises opgørelser for sygehusforbruget i relation til herkomst, dvs. om personen er indvandrer, efterkommer eller har dansk oprindelse. I gruppen af indvandrere indgår personer, der er født i udlandet og hvor ingen af forældrene er både dansk statsborger og født i Danmark. I gruppen af efterkommere indgår personer, der er født i Danmark og hvor ingen af forældrene er både dansk statsborger og født i Danmark. Personer med dansk oprindelse er personer – uanset fødested – der har mindst én forælder, som både er dansk statsborger og født i Danmark. Tabellerne er der yderligere opdelt efter to grupper af oprindelsesland: Vestlige og Ikke-vestlige lande. Vestlige lande består af EU-landene samt Island, Norge, Schweiz, Liechtenstein, Monaco, Andorra, San Marino, Vatikanstaten, USA, Canada, Australien og New Zealand. Ikke-vestlige lande omfatter alle øvrige lande.

Det fremgår af tabel 29, at indvandrere fra vestlige lande har et sygehusforbrug, der ligger under gennemsnittet for alle næsten uanset aldersgruppe. Særlig udtalt er det i de yngste aldersgrupper (især 20-24 år). Omvendt har mænd og kvinder, der er indvandrere fra ikke-vestlige lande et sygehusforbrug, som ligger henholdsvis 10 og 7 pct. over gennemsnittet for alle. Når det kommer til andel med ambulante behandling ligger er tilsvarende hhv. 7 og blot 1 pct. over gennemsnittet, jf. tabel 30.

I tabel 31 er sengedagsforbruget vist i relation til herkomst. Det generelle billede er, at indvandrere af begge køn har et sengedagsforbrug, der ligger under gennemsnittet for alle. Dette gælder uanset om de har oprindelse i vestlige eller ikke vestlige lande. Billedet ændrer sig lidt mht. det gennemsnitlige antal ambulante behandlinger, hvor indvandrere fra vestlige lande ligger omkring gennemsnittet, mens mandlige indvandrere fra ikke-vestlige lande ligger 12 pct. og tilsvarende kvinder ligger 6 pct. over gennemsnittet, jf. tabel 32.

Tidligere undersøgelser viser, at det gennemsnitlige sengedagsforbrug falder noget for indvandrere fra ikke vestlige lande for både mændenes og kvindernes vedkommende, når der korrigeres for den socioøkonomiske gruppering

6. Baggrundsoplysninger

Mere information www.dst.dk/stattabel/580 og www.dst.dk/stattabel/1551.
Der er endvidere mulighed for at købe flere oplysninger som serviceopgave.

Seneste offentliggørelse *Sygehusbenyttelse 2011* udkom 9. oktober 2012 i serien *Sociale forhold, sundhed og retsvæsen 2012:9* (Statistiske Efterretninger).

Næste offentliggørelse Dette er den sidste offentliggørelse af *Sygehusbenyttelse* i serien *Sociale forhold, sundhed og retsvæsen* (Statistiske Efterretninger). Fremover henvises til Statistikbanken og *Nyt fra Danmarks Statistik*. Tal for 2013 forventes at udkomme i oktober 2014.

Henvendelse Kamilla Heurlén, tlf. 39 17 34 93, kah@dst.dk
Connie Østberg, tlf. 39 17 33 84, cbn@dst.dk

7. Kilder og metoder

Kvalitetsdeklaration På www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/956 er der en mere omfattende beskrivelse af kilder og metoder til indlæggelser. Der findes en særskilt kvalitetsdeklaration for de ambulante behandlinger på www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/160077.

Datagrundlag Formålet med statistikken er at bidrage til en belysning af sammenhængen mellem sociale forhold og sygehusbenyttelse, og den er baseret på Danmarks Statistiks Sygehusbenyttelsesregister i kombination med oplysninger fra en række af Danmarks Statistiks øvrige personstatistiske registre. Sygehusbenyttelsesregisteret bygger på oplysninger fra Landspatientregistret fra Statens Serum Institut og er opdateret årligt fra og med statistikåret 1990.

Sygehusbenyttelsesregistret har hidtil alene omfattet indlæggelser men blev i oktober 2011 udvidet til også at omfatte ambulante behandlinger fra perioden 2006 og frem.

- Landspatientregistret* Landspatientregisteret (LPR) blev etableret i 1977 i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Københavns og Frederiksberg Kommuner og Amtsrådsforeningen i Danmark. Formålet med LPR er at danne grundlag for Statens Serum Instituts dokumentation af aktivitet i sygehusvæsenet og for myndighedernes sygehusplanlægning. Registeret opdateres løbende med oplysninger om befolkningens kontakter med sygehusvæsenet. Det gælder både for hel- og deldøgnsindlæggelser, for ambulante besøg og for skadestuebesøg. Patienter på psykiatriske afdelinger og sygehuse registreres ligeledes i Det Psykiatriske Centralregister. Det er således kun en del af Landspatientregistrets informationer, som anvendes i statistikken.
- Indlæggelse* Enheden i LPR er en *udskrivning*. Dvs. at data vedrørende et sygehusophold først registreres i LPR, når patienten bliver udskrevet. Fra LPR modtager Danmarks Statistik oplysninger om alle udskrivninger, der er foretaget af *indlagte patienter* (dvs. ekskl. ambulante behandlinger) på *somatiske sygehusafdelinger* i et kalenderår, inkl. døde personer. I denne artikel er begreberne *indlæggelser* og *indlagte personer* anvendt synonymt for henholdsvis udskrivninger og udskrevne personer.
- Ambulant behandling* Ambulante patienter er i LPR angivet med særlig patienttype. Såfremt en person har fx to besøg på samme dag, bliver det kun talt som én ambulant behandling. Sprogligt anvendes begrebet ambulant behandling, mens begrebet ambulant besøg anses som synonymt. Ambulante behandlinger er ikke tidligere blevet offentliggjort sammen med indlæggelser, som tilfældet er i denne Statistiske Efterretning.
- Socioøkonomiske oplysninger* Fra Danmarks Statistiks personstatistiske registre hentes en række oplysninger om den enkelte person. Det er oplysninger vedrørende familietype, beskæftigelse, uddannelse, bolig og herkomst.
- Historik* Til og med Sygehusbenyttelse 2008 blev modtagelse af sociale ydelser også inddraget fra den Sammenhængende Socialstatistik. Da den Sammenhængende Socialstatistik er blevet nedlagt overvejes det om indarbejdelse af yderligere baggrundsvariable vedr. indkomst på et senere tidspunkt kan indarbejdes i sygehusbenyttelses-statistikken.
- Til og med Sygehusbenyttelse 2011 blev indlæggelser kombineret med arbejdsfunktion, og tabeller på detaljeret niveau var en del af efterretningen. Det kan overvejes at inddrage oplysninger om arbejdsfunktion på såvel indlæggelser som ambulante behandlinger på et senere tidspunkt.
- Til og med Sygehusbenyttelse 2011 blev der udover standardisering for køn og alder foretaget standardisering for socioøkonomisk sammensætning (og for børnenes vedkommende for familiens uddannelse), da tidligere analyser har vist, at den socioøkonomiske gruppering har den største selvstændige betydning for de voksnes sygehusforbrug. For børnenes vedkommende er det familiens uddannelsesniveau, der har den største betydning.
- Udvidet præsentation i statistikbanken mv.* Fra oktober 2013 med offentliggørelsen af Sygehusbenyttelse for 2012 er præsentationen af Sygehusbenyttelse er omlagt og udvidet markant. Arbejdet er udført primært af fulmægtig Amy Frølander og afdelingsleder Dorthe Larsen. Det er hermed lykkedes at integrere produktionen og præsentationen af indlæggelser og ambulante behandlinger med flere tabeller, som giver nye muligheder for nøgletal på forskellige områder. Den samlede præsentation af tabellerne i denne sidste Statistiske Efterretning er foretaget af kontorfuldmægtig Connie Østberg.

Tabel 1. Indlagte personer fordelt efter køn og udskrivningsdiagnose (S-listen). 2012

	Mænd	Kvinder	I alt	Mænd	Kvinder	I alt
	antal			pct.		
I alt¹	310 736	391 201	701 937	100	100	100
Levendefødte	29 347	27 697	57 044	9,4	7,1	8,1
Patienter uden symptomer eller sygdom	13 612	20 803	34 415	4,4	5,3	4,9
Infektions- og parasitære sygdomme	18 046	16 276	34 322	5,8	4,2	4,9
Svulster	23 693	28 045	51 738	7,6	7,2	7,4
Ernærings- og stofskiftesygdomme	12 169	16 353	28 522	3,9	4,2	4,1
Sygdomme i blod og bloddannende organer	4 988	5 875	10 863	1,6	1,5	1,5
Psykiske lidelser	7 166	5 380	12 546	2,3	1,4	1,8
Sygdomme i:						
Nervesystem og sanseorganer	16 944	16 410	33 354	5,5	4,2	4,8
Kredsløbsorganer	49 445	37 551	86 996	15,9	9,6	12,4
Åndedrætsorganer	37 986	34 869	72 855	12,2	8,9	10,4
Fordøjelsesorganer	34 573	35 383	69 956	11,1	9,0	10,0
Urin- og kønsorganer	18 789	30 437	49 226	6,0	7,8	7,0
Svangerskab, under fødsel og i barselsseng	-	66 073	66 073	0,0	16,9	9,4
Hud og underhud	7 402	6 028	13 430	2,4	1,5	1,9
Knogler, bevægelsessystem og bindevæv	23 448	29 449	52 897	7,5	7,5	7,5
Medfødte misdannelser	3 985	2 951	6 936	1,3	0,8	1,0
Visse årsager til sygdomme i perinatalperioden	4 936	3 665	8 601	1,6	0,9	1,2
Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande	88 874	98 506	187 380	28,6	25,2	26,7
Traumer, forgiftninger og anden voldelig legemsbeskadigelse	43 589	44 449	88 038	14,0	11,4	12,5

¹ Antal personer netto. Tallet er mindre end summen af underkategorierne, da samme person kan have været indlagt med diagnoser indenfor flere forskellige diagnosegrupper.

Tabel 2. Personer med ambulant behandling fordelt efter køn og udskrivningsdiagnose (S-listen). 2012

	Mænd	Kvinder	I alt	Mænd	Kvinder	I alt
	antal			pct.		
I alt¹	725 431	926 439	1651 870	100	100	100
Levendefødte	-	-	-	-	-	-
Patienter uden symptomer eller sygdom	59 391	149 562	208 953	8,2	16,1	12,6
Infektions- og parasitære sygdomme	14 232	11 320	25 552	2,0	1,2	1,5
Svulster	71 958	91 749	163 707	9,9	9,9	9,9
Ernærings- og stofskiftesygdomme	52 940	67 732	120 672	7,3	7,3	7,3
Sygdomme i blod og bloddannende organer	9 053	10 526	19 579	1,2	1,1	1,2
Psykiske lidelser	6 191	7 381	13 572	0,9	0,8	0,8
Sygdomme i:						
Nervesystem og sanseorganer	116 528	124 435	240 963	16,1	13,4	14,6
Kredsløbsorganer	84 655	69 643	154 298	11,7	7,5	9,3
Åndedrætsorganer	38 479	38 822	77 301	5,3	4,2	4,7
Fordøjelsesorganer	67 705	73 378	141 083	9,3	7,9	8,5
Urin- og kønsorganer	45 187	85 115	130 302	6,2	9,2	7,9
Svangerskab, under fødsel og i barselsseng	-	32 799	32 799	0,0	3,5	2,0
Hud og underhud	21 882	27 376	49 258	3,0	3,0	3,0
Knogler, bevægelsessystem og bindevæv	121 067	179 316	300 383	16,7	19,4	18,2
Medfødte misdannelser	17 162	15 458	32 620	2,4	1,7	2,0
Visse årsager til sygdomme i perinatalperioden	3 338	2 669	6 007	0,5	0,3	0,4
Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande	241 092	290 288	531 380	33,2	31,3	32,2
Traumer, forgiftninger og anden voldelig legemsbeskadigelse	76 024	71 734	147 758	10,5	7,7	8,9

¹ Jf. note 1 til tabel 1.

Tabel 3 A. Indlagte mænd procentvis fordelt efter alder og udskrivningsdiagnose (S-listen). 2012

	Alder									
	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
	pct.									
I alt¹	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Levendefødte	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Patienter uden symptomer eller sygdom	1,3	2,0	1,7	2,0	2,4	2,7	3,2	3,2	3,8	4,1
Infektions- og parasitære sygdomme	14,7	6,3	4,1	4,2	4,4	4,4	4,2	4,5	4,3	4,3
Svulster	0,8	1,3	1,6	1,7	1,7	2,3	3,1	3,5	4,1	5,0
Ernærings- og stofskiftesygdomme	4,5	2,9	3,7	3,0	2,2	2,7	3,0	3,0	3,6	3,6
Sygdomme i blod og bloddannende organer	1,0	1,6	1,1	0,7	0,4	0,5	0,5	0,7	0,8	0,7
Psykiske lidelser	0,6	1,6	1,6	4,0	4,2	3,3	2,7	3,5	3,7	4,6
Sygdomme i:										
Nervesystem og sanseorganer	6,8	7,6	8,1	5,5	4,7	5,7	5,9	6,4	5,9	6,2
Kredsløbsorganer	0,3	0,7	1,2	2,1	3,3	3,9	5,1	7,4	10,7	14,2
Åndedrætsorganer	34,1	17,1	8,1	8,5	7,9	7,6	8,6	8,2	7,4	7,0
Fordøjelsesorganer	4,8	7,5	10,6	10,4	12,4	13,1	14,3	14,0	13,9	13,8
Urin- og kønsorganer	2,5	5,3	7,0	4,9	4,4	5,0	5,8	5,3	5,4	5,7
Svangerskab, under fødsel og i barselsseng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hud og underhud	2,8	2,5	2,2	4,3	5,7	5,2	5,0	4,3	3,3	3,2
Knogler, bevægelsessystem og bindevæv	2,2	4,6	4,4	4,9	5,9	7,0	8,3	9,0	10,0	10,0
Medfødte misdannelser	6,2	6,2	5,6	4,8	1,9	1,2	0,9	0,7	0,5	0,5
Visse årsager til sygdomme i perinatalperioden	1,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande	31,5	29,8	29,2	23,5	25,0	25,9	27,2	28,5	29,4	30,3
Traumer, forgiftninger og anden voldelig legemsbeskadigelse	8,4	17,6	23,5	30,4	30,0	27,1	21,9	20,0	18,4	17,5

¹ Jf. note 1 til tabel 1.**Tabel 3 B. Indlagte kvinder procentvis fordelt efter alder og udskrivningsdiagnose (S-listen). 2012**

	Alder									
	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
	pct.									
I alt¹	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Levendefødte	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Patienter uden symptomer eller sygdom	1,2	2,2	1,6	2,6	5,1	6,2	6,2	6,3	5,5	5,4
Infektions- og parasitære sygdomme	16,1	6,8	4,2	3,8	3,3	1,7	1,5	1,9	2,6	2,8
Svulster	1,0	1,9	2,0	1,7	1,5	1,3	1,8	3,4	7,4	11,5
Ernærings- og stofskiftesygdomme	5,8	4,9	5,0	2,5	1,5	1,3	1,5	2,5	4,2	4,9
Sygdomme i blod og bloddannende organer	0,7	1,7	1,1	0,8	0,5	0,3	0,3	0,6	1,2	1,4
Psykiske lidelser	0,6	1,2	2,8	3,7	1,8	0,7	0,6	0,8	1,6	2,0
Sygdomme i:										
Nervesystem og sanseorganer	6,6	7,5	8,2	4,8	3,2	2,3	2,4	3,1	4,9	5,4
Kredsløbsorganer	0,4	0,8	1,2	1,6	1,8	1,2	1,5	2,5	5,5	7,7
Åndedrætsorganer	29,0	14,5	8,3	9,2	5,2	2,6	2,5	3,5	4,6	5,8
Fordøjelsesorganer	4,5	7,7	10,3	10,1	8,7	5,4	4,9	7,2	10,4	12,3
Urin- og kønsorganer	4,6	8,6	4,7	7,5	7,7	5,2	5,0	7,5	12,6	14,3
Svangerskab, under fødsel og i barselsseng	0,0	0,0	0,1	9,9	38,6	65,8	68,5	49,9	17,5	1,2
Hud og underhud	3,0	2,9	2,1	3,2	2,3	1,2	1,0	1,5	1,9	2,0
Knogler, bevægelsessystem og bindevæv	2,0	3,5	7,3	5,1	3,2	2,5	2,5	4,4	7,8	9,5
Medfødte misdannelser	3,6	4,3	4,5	2,9	1,2	0,6	0,4	0,4	0,7	0,6
Visse årsager til sygdomme i perinatalperioden	1,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande	33,8	31,6	33,6	31,5	26,0	15,9	13,8	18,7	26,4	29,9
Traumer, forgiftninger og anden voldelig legemsbeskadigelse	8,3	16,1	19,1	18,5	11,2	5,2	4,4	6,1	9,8	11,4

¹ Jf. note 1 til tabel 1.

Tabel 3 A. (fortsat)

Alder								I alt	
50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
pct.									
100	100	100	100	100	100	100	100	100	I alt ¹
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	Levendefødte
4,9	5,2	5,7	6,0	6,4	7,2	7,0	7,4	4,4	Patienter uden symptomer eller sygdom
4,3	4,5	5,0	5,4	5,9	6,9	8,2	9,4	5,8	Infektions- og parasitære sygdomme
7,2	9,6	12,6	15,4	15,3	13,8	12,1	9,1	7,6	Svulster
3,8	4,1	4,2	4,3	4,3	5,3	6,4	8,0	3,9	Ernærings- og stofskiftesygdomme
1,1	1,3	1,5	2,2	2,4	2,9	3,7	4,9	1,6	Sygdomme i blod og bloddannende organer
4,5	3,5	2,5	1,7	1,3	1,4	1,7	2,0	2,3	Psykiske lidelser
									Sygdomme i:
6,3	6,2	6,3	6,3	6,0	5,5	4,8	3,6	5,5	Nervesystem og sanseorganer
18,7	22,0	25,1	26,7	28,2	29,3	28,1	26,5	15,9	Kredsløbsorganer
7,5	8,8	10,0	10,9	13,0	16,1	20,2	23,1	12,2	Åndedrætsorganer
13,3	13,4	12,8	12,5	12,3	12,1	12,8	12,5	11,1	Fordøjelsesorganer
5,2	5,5	6,5	7,2	8,0	9,0	10,3	11,4	6,0	Urin- og kønsorganer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Svangerskab, under fødsel og i barsels seng
2,5	2,4	2,2	1,8	1,5	1,5	1,3	1,2	2,4	Hud og underhud
10,2	10,7	9,9	10,5	10,6	9,6	7,2	4,8	7,5	Knogler, bevægelsessystem og bindevæv
0,4	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	1,3	Medfødte misdannelser
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	Visse årsager til sygdomme i perinatalperioden
30,8	29,4	30,3	30,4	31,6	33,8	35,6	36,5	28,6	Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande
									Traumer, forgiftninger og anden voldelig legemsbeskadigelse
16,0	14,2	12,0	10,9	10,8	11,0	11,5	14,1	14,0	

Tabel 3 B. (fortsat)

Alder								I alt	
50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
pct.									
100	100	100	100	100	100	100	100	100	I alt ¹
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	Levendefødte
5,3	5,7	5,6	5,7	5,9	6,9	7,1	8,2	5,3	Patienter uden symptomer eller sygdom
3,3	3,7	4,0	4,2	5,0	5,3	6,6	7,1	4,2	Infektions- og parasitære sygdomme
12,7	13,3	14,8	15,6	14,0	12,1	9,9	5,8	7,2	Svulster
4,5	4,7	4,6	4,9	4,9	6,2	7,6	9,8	4,2	Ernærings- og stofskiftesygdomme
1,3	1,3	1,5	1,7	2,4	2,9	3,9	4,4	1,5	Sygdomme i blod og bloddannende organer
2,1	1,8	1,5	1,2	1,2	1,2	1,7	2,2	1,4	Psykiske lidelser
									Sygdomme i:
5,7	5,8	5,3	5,5	5,4	4,9	4,1	3,4	4,2	Nervesystem og sanseorganer
10,0	12,1	14,9	16,6	19,4	21,8	23,3	24,4	9,6	Kredsløbsorganer
6,6	8,6	9,6	10,5	12,7	14,1	16,4	16,4	8,9	Åndedrætsorganer
12,4	12,4	12,2	11,2	11,0	11,1	11,5	12,0	9,0	Fordøjelsesorganer
11,4	8,6	8,6	8,0	8,5	8,3	9,0	10,3	7,8	Urin- og kønsorganer
0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	Svangerskab, under fødsel og i barsels seng
2,0	1,8	1,6	1,4	1,2	1,2	1,1	1,2	1,5	Hud og underhud
10,8	12,4	12,8	13,8	14,3	13,8	10,4	6,9	7,5	Knogler, bevægelsessystem og bindevæv
0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,8	Medfødte misdannelser
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	Visse årsager til sygdomme i perinatalperioden
29,5	29,4	28,0	27,8	28,8	30,7	32,3	31,8	25,2	Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande
									Traumer, forgiftninger og anden voldelig legemsbeskadigelse
12,5	13,1	13,4	13,7	14,2	15,4	17,3	21,8	11,4	

Tabel 4 A. Mænd med ambulant behandling fordelt efter alder og udskrivningsdiagnose (S-listen). 2012

	Alder									
	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
	pct.									
I alt¹	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Levendefødte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patienter uden symptomer eller sygdom	4,7	3,7	5,1	4,5	5,0	7,0	9,0	9,5	8,3	7,2
Infektions- og parasitære sygdomme	2,8	1,1	0,9	1,2	3,5	4,4	3,9	3,4	3,5	3,2
Svulster	1,7	1,4	1,7	2,2	2,7	3,5	4,1	4,7	5,3	6,0
Ernærings- og stofskiftesygdomme	2,6	4,7	7,0	6,8	4,4	4,7	5,8	6,9	7,7	8,7
Sygdomme i blod og bloddannende organer	1,4	1,3	0,9	0,7	0,7	0,8	1,1	1,2	1,1	1,1
Psykiske lidelser	1,1	3,5	3,5	1,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5
Sygdomme i:										
Nervesystem og sanseorganer	10,3	14,1	12,9	9,9	9,4	10,6	11,6	12,3	13,1	14,3
Kredsløbsorganer	0,7	0,7	0,9	1,5	2,2	2,6	3,7	4,9	6,7	9,0
Åndedrætsorganer	14,6	11,9	11,2	7,1	4,7	4,2	4,7	4,3	4,0	3,5
Fordøjelsesorganer	6,8	6,0	5,1	8,9	10,1	9,2	9,7	9,6	10,3	10,8
Urin- og kønsorganer	3,8	5,7	4,6	4,5	6,0	7,5	8,7	7,4	6,0	5,4
Svangerskab, under fødsel og i barsels seng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hud og underhud	3,6	2,2	2,0	4,6	4,8	4,3	3,9	3,6	3,3	3,3
Knogler, bevægelsessystem og bindevæv	4,0	5,5	9,7	14,7	16,8	19,0	18,9	20,2	21,4	22,4
Medfødte misdannelser	17,2	11,1	8,2	6,0	2,9	1,9	1,8	1,4	1,3	1,0
Visse årsager til sygdomme i perinatalperioden	3,4	0,6	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande	39,3	35,1	29,0	25,1	25,0	23,8	23,4	24,7	26,2	27,8
Traumer, forgiftninger og anden voldelig legemsbeskadigelse	8,1	11,6	18,8	23,2	24,4	20,6	16,2	14,3	13,5	12,0

¹ Jf. note 1 til tabel 1.

Tabel 4 B. Kvinder med ambulant behandling fordelt efter alder og udskrivningsdiagnose (S-listen). 2012

	Alder									
	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
	pct.									
I alt¹	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Levendefødte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patienter uden symptomer eller sygdom	4,8	4,5	5,1	10,2	27,2	47,7	49,4	32,2	14,5	8,1
Infektions- og parasitære sygdomme	3,1	1,3	0,9	1,2	2,7	1,7	1,6	1,7	1,7	1,5
Svulster	3,0	2,0	2,0	2,9	3,2	2,9	3,3	4,9	7,8	11,0
Ernærings- og stofskiftesygdomme	3,5	9,0	10,8	6,0	4,1	4,7	6,1	7,9	9,0	9,3
Sygdomme i blod og bloddannende organer	1,2	1,2	0,8	0,9	0,8	0,6	0,8	1,1	1,2	1,4
Psykiske lidelser	1,1	2,2	2,1	1,2	0,5	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6
Sygdomme i:										
Nervesystem og sanseorganer	10,4	14,8	12,7	9,0	6,9	5,8	6,3	8,6	11,1	11,9
Kredsløbsorganer	0,6	0,6	0,8	1,3	1,7	1,7	2,5	4,1	5,8	6,8
Åndedrætsorganer	11,9	9,2	8,1	6,8	3,9	2,3	2,2	2,8	3,1	3,2
Fordøjelsesorganer	7,3	6,5	5,9	9,8	9,1	6,1	5,8	7,3	8,8	9,2
Urin- og kønsorganer	3,5	4,6	2,9	5,1	10,1	11,6	12,0	14,1	14,1	14,2
Svangerskab, under fødsel og i barsels seng	0,0	0,0	0,1	4,3	11,7	14,4	13,8	9,9	3,8	0,4
Hud og underhud	3,7	2,7	2,9	4,1	3,8	2,6	2,4	2,9	3,3	3,4
Knogler, bevægelsessystem og bindevæv	4,4	5,9	15,5	21,0	13,7	9,5	9,7	14,0	19,2	22,8
Medfødte misdannelser	13,2	8,6	7,9	5,0	2,3	1,3	1,1	1,1	1,2	1,0
Visse årsager til sygdomme i perinatalperioden	3,5	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande	40,2	34,8	28,1	26,3	25,2	21,9	20,7	24,0	28,5	31,3
Traumer, forgiftninger og anden voldelig legemsbeskadigelse	8,2	11,4	16,6	14,0	9,2	5,6	4,4	5,7	7,1	7,4

¹ Jf. note 1 til tabel 1.

Tabel 4 A. (fortsat)

Alder								I alt	
50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
pct.									
100	100	100	100	100	100	100	100	100	I alt ¹
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Levendefødte
7,4	7,8	8,5	9,5	10,6	11,7	12,3	13,4	8,2	Patienter uden symptomer eller sygdom
2,6	2,0	1,6	1,0	0,8	0,6	0,7	0,9	2,0	Infektions- og parasitære sygdomme
7,5	9,7	12,9	16,8	19,3	21,0	22,1	20,4	9,9	Svulster
9,7	9,8	10,2	9,5	8,2	7,0	5,4	3,4	7,3	Ernærings- og stofskiftesygdomme
1,1	1,2	1,2	1,3	1,5	1,8	2,2	2,8	1,2	Sygdomme i blod og bloddannende organer
0,4	0,4	0,4	0,4	0,6	1,0	1,5	2,0	0,9	Psykiske lidelser
									Sygdomme i:
15,3	15,9	17,6	19,6	22,0	24,4	26,8	27,7	16,1	Nervesystem og sanseorganer
12,0	14,7	17,3	19,5	21,1	23,2	23,3	20,5	11,7	Kredsløbsorganer
3,9	4,1	4,3	4,6	4,7	5,5	5,6	4,5	5,3	Åndedrætsorganer
11,2	11,4	10,8	10,7	9,6	9,0	8,3	6,9	9,3	Fordøjelsesorganer
5,2	5,3	6,4	7,0	7,3	8,2	8,3	7,8	6,2	Urin- og kønsorganer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Svangerskab, under fødsel og i barsels seng
3,0	3,1	2,8	2,7	2,4	2,4	2,6	3,1	3,0	Hud og underhud
22,4	21,9	19,6	18,1	17,3	15,6	12,2	9,1	16,7	Knogler, bevægelsessystem og bindevæv
0,9	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1	2,4	Medfødte misdannelser
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	Visse årsager til sygdomme i perinatalperioden
29,4	31,3	33,0	35,3	36,6	37,0	36,2	35,5	33,2	Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande
									Traumer, forgiftninger og anden voldelig legemsbeskadigelse
10,1	8,4	7,0	5,9	5,5	5,1	5,1	6,4	10,5	

Tabel 4 B. (fortsat)

Alder								I alt	
50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
pct.									
100	100	100	100	100	100	100	100	100	I alt ¹
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Levendefødte
7,1	7,3	7,2	7,4	7,7	8,4	9,6	11,1	16,1	Patienter uden symptomer eller sygdom
1,2	1,0	0,9	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	1,2	Infektions- og parasitære sygdomme
12,7	13,4	15,8	17,9	17,4	16,1	15,2	12,5	9,9	Svulster
9,4	9,5	9,2	8,4	7,5	6,8	5,6	3,8	7,3	Ernærings- og stofskiftesygdomme
1,1	1,0	1,0	1,2	1,3	1,6	1,9	2,3	1,1	Sygdomme i blod og bloddannende organer
0,6	0,5	0,3	0,3	0,6	1,1	2,0	2,8	0,8	Psykiske lidelser
									Sygdomme i:
12,7	13,5	14,6	16,3	19,3	23,4	26,7	28,9	13,4	Nervesystem og sanseorganer
7,4	8,3	10,1	11,8	13,8	16,4	17,8	17,1	7,5	Kredsløbsorganer
3,3	4,0	4,1	4,4	5,0	5,7	5,4	3,6	4,2	Åndedrætsorganer
9,2	9,3	9,5	8,9	8,6	8,2	7,3	5,6	7,9	Fordøjelsesorganer
11,2	8,4	7,6	7,4	7,4	7,4	7,1	6,3	9,2	Urin- og kønsorganer
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	Svangerskab, under fødsel og i barsels seng
3,3	3,3	2,9	2,9	2,5	2,4	2,7	3,4	3,0	Hud og underhud
25,7	27,4	26,4	26,6	27,2	25,7	22,1	14,8	19,4	Knogler, bevægelsessystem og bindevæv
0,9	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2	0,1	1,7	Medfødte misdannelser
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	Visse årsager til sygdomme i perinatalperioden
32,2	33,3	33,6	34,1	34,4	33,9	31,9	29,3	31,3	Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande
									Traumer, forgiftninger og anden voldelig legemsbeskadigelse
7,7	8,1	7,9	7,7	7,6	7,6	8,0	9,7	7,7	

Tabel 5 A. Indeks for indlagte patienter fordelt efter regioner og landsdele¹. Mænd. Sygdomsdiagnoser. 2012

	Alder									
	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
	mænd hele landet = 100									
Hele landet	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Region Hovedstaden	111	125	120	110	102	100	101	100	102	107
Københavns by	110	125	121	103	91	86	89	90	101	107
Københavns omegn	116	127	118	107	109	119	113	107	99	107
Nordsjælland	110	124	123	118	113	140	132	115	104	104
Bornholm	84	101	102	128	160	146	135	138	126	144
Region Sjælland	113	118	125	116	126	137	131	122	115	111
Østsjælland	105	109	118	102	115	115	118	105	101	96
Vest- og Sydsjælland	116	122	128	122	131	144	136	130	122	117
Region Syddanmark	104	89	90	93	97	99	98	99	96	94
Fyn	102	89	85	84	86	84	80	87	88	85
Syddjylland	106	89	92	100	105	111	110	107	102	100
Region Midtjylland	77	74	77	88	90	89	90	92	92	93
Østjylland	66	68	74	82	85	83	84	86	88	92
Vestjylland	100	85	83	98	101	104	101	103	101	95
Region Nordjylland	89	82	82	93	94	92	90	89	97	90
Nordjylland	89	82	82	93	94	92	90	89	97	90

¹ Bopæl 1.1.2012.

² Indeks angiver hvor stor en andel af en given befolkningsgruppe, der har været indlagt på sygehus. Tallene er standardiserede, dvs. der er korrigeret for, at køn- og aldersfordelingen ikke er ens for de forskellige områder. Hermed er det muligt at sammenligne på tværs af grupperne. Indeks lig med 100 angiver gennemsnittet for hhv. mænd og kvinder i den givne aldersgruppe.

Tabel 5 B. Indeks for indlagte patienter fordelt efter regioner og landsdele¹. Kvinder. Sygdomsdiagnoser. 2012

	Alder									
	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
	kvinder hele landet = 100									
Hele landet	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Region Hovedstaden	115	123	120	105	101	94	95	100	106	108
Københavns by	111	126	112	97	84	77	80	87	96	107
Københavns omegn	124	125	123	105	114	115	106	106	113	113
Nordsjælland	114	119	126	113	138	154	137	116	111	104
Bornholm	91	96	115	112	153	164	149	141	122	112
Region Sjælland	115	123	122	133	140	155	137	130	118	113
Østsjælland	111	118	112	118	122	138	113	116	102	90
Vest- og Sydsjælland	117	126	127	139	149	161	147	136	126	123
Region Syddanmark	101	86	91	90	94	102	96	94	92	92
Fyn	99	85	88	81	78	85	85	87	83	86
Syddjylland	102	87	92	96	106	114	104	98	99	97
Region Midtjylland	75	76	79	83	84	86	93	90	88	90
Østjylland	64	65	73	82	79	81	90	88	86	90
Vestjylland	96	97	91	85	98	101	99	95	91	90
Region Nordjylland	85	84	78	96	102	99	98	93	96	94
Nordjylland	85	84	78	96	102	99	98	93	96	94

¹ Jf. note 1 i tabel 5 A.

² Jf. note 2 i tabel 5 A.

Tabel 5 A. (fortsat)

Alder								I alt ²	
50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
— mænd hele landet = 100 —									
100	100	100	100	100	100	100	100	100	Hele landet
109	109	111	110	108	107	109	108	108	Region Hovedstaden
112	114	118	117	118	113	120	113	107	Københavns by
106	104	108	106	108	106	106	107	109	Københavns omegn
106	107	104	106	101	102	106	105	108	Nordsjælland
126	125	122	114	110	106	94	85	115	Bornholm
111	108	106	106	105	104	105	105	111	Region Sjælland
94	98	100	104	106	104	105	104	104	Østsjælland
117	112	107	107	105	104	105	105	113	Vest- og Sydsjælland
93	95	92	93	95	97	95	97	95	Region Syddanmark
85	90	88	90	91	95	89	93	89	Fyn
98	99	96	96	98	99	99	101	99	Syddjylland
91	92	96	95	97	96	95	95	91	Region Midtjylland
89	91	95	94	96	97	94	96	88	Østjylland
95	92	98	98	98	95	96	94	97	Vestjylland
94	93	90	89	89	93	93	91	91	Region Nordjylland
94	93	90	89	89	93	93	91	91	Nordjylland

Tabel 5 B. (fortsat)

Alder								I alt ²	
50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
— kvinder hele landet = 100 —									
100	100	100	100	100	100	100	100	100	Hele landet
111	111	111	109	109	109	111	113	108	Region Hovedstaden
110	111	113	115	116	116	117	122	103	Københavns by
115	111	114	110	108	107	107	108	111	Københavns omegn
103	109	105	104	104	104	112	110	111	Nordsjælland
138	113	115	101	111	107	91	93	111	Bornholm
112	109	109	103	104	106	104	102	113	Region Sjælland
100	99	100	99	102	110	106	108	106	Østsjælland
117	113	112	104	105	104	103	100	116	Vest- og Sydsjælland
94	94	94	94	94	95	93	93	94	Region Syddanmark
86	89	86	89	89	92	91	91	88	Fyn
100	98	101	97	97	97	95	95	98	Syddjylland
87	91	91	95	95	94	94	92	89	Region Midtjylland
88	91	91	96	97	95	96	92	88	Østjylland
85	92	90	94	93	93	91	90	92	Vestjylland
93	90	89	93	91	92	93	90	92	Region Nordjylland
93	90	89	93	91	92	93	90	92	Nordjylland

Tabel 6 A. Indeks for ambulante patienter fordelt efter regioner og landsdele¹. Mænd. Sygdomsdiagnoser. 2012

	Alder									
	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
	mænd hele landet = 100									
Hele landet	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Region Hovedstaden	85	89	93	94	88	85	86	87	86	90
Københavns by	80	86	86	90	84	83	83	85	87	95
Københavns omegn	89	89	93	97	92	87	91	87	85	88
Nordsjælland	90	95	98	95	90	91	90	87	82	84
Bornholm	71	76	82	102	125	123	126	121	107	114
Region Sjælland	111	110	109	97	95	95	96	93	92	92
Østsjælland	105	97	105	92	92	86	84	85	81	83
Vest- og Sydsjælland	113	116	111	99	97	98	100	97	97	96
Region Syddanmark	115	122	117	114	117	126	123	122	122	118
Fyn	101	111	112	113	118	128	125	125	123	118
Syddjylland	125	129	120	115	117	124	121	120	121	119
Region Midtjylland	107	94	94	98	103	108	109	106	106	104
Østjylland	110	91	92	94	102	109	109	109	107	105
Vestjylland	100	98	98	103	106	104	108	101	105	102
Region Nordjylland	89	87	85	94	99	93	92	96	98	94
Nordjylland	89	87	85	94	99	93	92	96	98	94

¹ Jf. note 1 i tabel 5 A.

² Indeks angiver hvor stor en andel af en given befolkningsgruppe, der har modtaget ambulante behandling på sygehus. Tallene er standardiserede, dvs. der er korrigeret for, at køn- og aldersfordelingen ikke er ens for de forskellige uddannelsesniveauer. Hermed er det muligt at sammenligne på tværs af grupperne. Indeks lig med 100 angiver gennemsnittet for hhv. mænd og kvinder i den givne aldersgruppe.

Tabel 6 B. Indeks for ambulante patienter fordelt efter regioner og landsdele¹. Kvinder. Sygdomsdiagnoser. 2012

	Alder									
	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
	kvinder hele landet = 100									
Hele landet	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Region Hovedstaden	85	89	94	89	84	78	82	86	88	89
Københavns by	80	85	85	81	77	74	78	84	88	91
Københavns omegn	89	91	95	95	93	86	88	90	93	92
Nordsjælland	89	92	102	90	88	84	84	83	82	81
Bornholm	85	79	86	107	155	128	140	138	114	124
Region Sjælland	111	114	108	99	96	102	95	94	93	93
Østsjælland	107	101	98	85	85	91	82	86	84	83
Vest- og Sydsjælland	113	121	113	105	101	106	100	98	98	97
Region Syddanmark	117	114	117	117	123	129	122	120	118	117
Fyn	108	104	110	116	121	123	120	118	116	115
Syddjylland	122	120	122	118	124	133	124	121	119	119
Region Midtjylland	107	95	92	96	103	112	111	107	104	104
Østjylland	111	93	89	96	102	109	109	106	104	105
Vestjylland	98	100	96	98	106	120	116	109	104	102
Region Nordjylland	86	93	87	100	105	107	106	99	102	100
Nordjylland	86	93	87	100	105	107	106	99	102	100

¹ Jf. note 1 i tabel 5 A.

² Jf. note 2 i tabel 6 A.

Tabel 6 A. (fortsat)

Alder								I alt ²	
50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
— mænd hele landet = 100 —									
100	100	100	100	100	100	100	100	100	Hele landet ²
93	95	96	99	100	101	105	108	93	Region Hovedstaden
98	101	102	106	106	110	115	122	94	Københavns by
90	93	96	96	98	99	104	108	94	Københavns omegn
86	87	89	93	95	96	98	97	91	Nordsjælland
112	113	108	108	98	98	97	95	105	Bornholm
93	92	94	93	93	93	94	94	95	Region Sjælland
84	88	94	93	96	101	102	106	92	Østsjælland
96	94	94	93	91	90	91	90	96	Vest- og Sydsjælland
116	114	111	111	110	109	106	107	115	Region Syddanmark
116	116	111	110	108	107	103	105	113	Fyn
116	113	111	112	111	110	109	108	115	Sydjylland
101	100	100	100	99	98	96	94	101	Region Midtjylland
102	101	101	101	98	100	98	95	102	Østjylland
99	98	98	98	100	96	93	93	100	Vestjylland
95	96	95	93	94	94	91	86	93	Region Nordjylland
95	96	95	93	94	94	91	86	93	Nordjylland

Tabel 6 B. (fortsat)

Alder								I alt ²	
50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
— kvinder hele landet = 100 —									
100	100	100	100	100	100	100	100	100	Hele landet ²
91	93	95	97	97	99	104	109	92	Region Hovedstaden
93	98	100	104	104	108	114	124	91	Københavns by
93	93	97	98	97	99	103	104	95	Københavns omegn
84	84	86	89	90	91	93	93	87	Nordsjælland
119	109	107	103	103	92	98	88	109	Bornholm
91	91	91	91	91	93	90	89	94	Region Sjælland
86	86	90	92	94	101	99	104	90	Østsjælland
94	93	92	91	90	90	87	85	96	Vest- og Sydsjælland
117	115	112	111	112	111	108	109	115	Region Syddanmark
113	113	110	110	111	109	106	107	113	Fyn
119	116	114	113	112	112	109	110	117	Sydjylland
102	102	102	102	102	100	98	95	102	Region Midtjylland
103	104	104	104	104	102	101	97	103	Østjylland
101	98	98	98	97	95	94	91	101	Vestjylland
98	96	96	95	92	92	92	82	96	Region Nordjylland
98	96	96	95	92	92	92	82	96	Nordjylland

Tabel 7 A. Indeks for gennemsnitlig sengedagsforbrug fordelt efter regioner og landsdele¹. Mænd. Sygdomsdiagnoser. 2012

	Alder									
	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
	mænd hele landet = 100									
Hele landet	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Region Hovedstaden	93	92	94	97	95	88	93	96	92	102
Københavns by	94	98	95	101	84	85	92	104	90	110
Københavns omegn	93	93	95	90	101	89	89	90	92	96
Nordsjælland	92	86	92	97	106	91	103	85	94	99
Bornholm	83	85	73	125	106	145	81	91	111	91
Region Sjælland	100	95	99	110	106	105	113	91	101	97
Østsjælland	109	91	85	110	111	139	91	82	95	97
Vest- og Sydsjælland	96	97	104	110	104	95	120	94	103	98
Region Syddanmark	104	97	106	91	96	100	105	102	103	101
Fyn	91	97	109	80	99	99	93	96	119	117
Syddjylland	113	97	105	97	95	101	111	105	93	91
Region Midtjylland	105	106	99	103	105	112	95	101	100	95
Østjylland	114	106	104	112	114	124	98	111	102	99
Vestjylland	93	106	91	90	88	88	89	83	98	89
Region Nordjylland	110	141	117	104	102	112	111	129	120	109
Nordjylland	110	141	117	104	102	112	111	129	120	109

¹ Jf. note 1 i tabel 5 A.

² Jf. note 2 i tabel 5 A.

Tabel 7 B. Indeks for gennemsnitlig sengedagsforbrug fordelt efter regioner og landsdele¹. Kvinder. Sygdomsdiagnoser. 2012

	Alder									
	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
	kvinder hele landet = 100									
Hele landet	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Region Hovedstaden	94	98	93	100	89	95	93	97	91	99
Københavns by	97	98	84	113	88	94	90	99	96	92
Københavns omegn	91	104	111	97	90	100	95	88	88	100
Nordsjælland	89	92	84	95	88	91	97	106	86	101
Bornholm	104	78	73	88	89	117	98	94	98	139
Region Sjælland	108	100	97	105	105	90	93	100	100	100
Østsjælland	110	94	120	108	107	106	91	93	85	99
Vest- og Sydsjælland	107	103	88	104	105	86	93	102	106	101
Region Syddanmark	99	106	104	94	109	105	109	103	99	100
Fyn	93	97	104	102	133	106	104	104	102	92
Syddjylland	102	111	104	90	96	104	112	102	98	104
Region Midtjylland	107	89	93	94	98	109	107	102	111	99
Østjylland	122	92	94	98	102	109	110	106	113	101
Vestjylland	87	86	91	88	90	108	100	93	108	95
Region Nordjylland	103	120	145	110	116	107	106	100	111	107
Nordjylland	103	120	145	110	116	107	106	100	111	107

¹ Jf. note 1 i tabel 5 A.

² Jf. note 2 i tabel 5 A.

Tabel 7 A. (fortsat)

Alder								I alt ²	
50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
— mænd hele landet = 100 —									
100	100	100	100	100	100	100	100	100	Hele landet²
102	104	106	106	106	104	110	112	104	Region Hovedstaden
110	108	104	113	108	110	116	115	106	Københavns by
100	98	104	100	107	101	109	113	102	Københavns omegn
90	101	109	105	99	102	104	109	101	Nordsjælland
123	139	116	108	130	110	114	107	115	Bornholm
103	107	103	101	104	103	104	103	103	Region Sjælland
97	101	99	102	104	99	110	113	102	Østsjælland
105	109	105	101	103	104	103	101	103	Vest- og Sydsjælland
96	100	95	96	99	97	94	94	97	Region Syddanmark
98	100	97	98	96	93	94	94	97	Fyn
95	99	93	95	100	100	94	93	97	Sydjylland
95	89	94	92	92	94	90	89	94	Region Midtjylland
105	91	97	94	92	94	92	91	97	Østjylland
78	85	88	88	93	95	88	84	89	Vestjylland
106	99	101	103	97	104	99	97	103	Region Nordjylland
106	99	101	103	97	104	99	97	103	Nordjylland

Tabel 7 B. (fortsat)

Alder								I alt ²	
50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
— kvinder hele landet = 100 —									
100	100	100	100	100	100	100	100	100	Hele landet²
97	97	99	103	103	107	110	115	103	Region Hovedstaden
100	97	105	105	105	114	117	122	107	Københavns by
90	91	91	102	101	105	104	113	101	Københavns omegn
96	101	93	100	101	101	107	107	100	Nordsjælland
148	119	143	138	117	118	137	109	122	Bornholm
104	106	109	105	110	102	102	101	103	Region Sjælland
98	105	107	105	114	103	112	120	107	Østsjælland
106	106	109	105	108	101	99	95	102	Vest- og Sydsjælland
99	96	95	93	93	94	93	89	95	Region Syddanmark
95	95	95	90	89	90	86	88	92	Fyn
101	97	94	95	95	97	98	90	97	Sydjylland
99	100	97	97	95	91	88	83	94	Region Midtjylland
101	103	100	99	98	91	91	86	97	Østjylland
94	94	91	93	88	89	82	78	89	Vestjylland
106	108	106	101	101	107	103	100	105	Region Nordjylland
106	108	106	101	101	107	103	100	105	Nordjylland

Tabel 8 A. Indeks for gennemsnitlig antal ambulante behandlinger fordelt efter regioner og landsdele¹. Mænd. Sygdomsdiagnoser. 2012

	Alder									
	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
	mænd hele landet = 100									
Hele landet	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Region Hovedstaden	108	108	105	104	106	106	107	108	108	111
Københavns by	109	109	104	105	106	103	104	108	115	117
Københavns omegn	110	111	110	108	111	108	112	111	102	108
Nordsjælland	105	105	103	101	100	116	113	106	103	111
Bornholm	72	95	79	93	79	83	119	78	103	80
Region Sjælland	100	101	101	96	97	93	97	95	100	93
Østsjælland	99	101	103	98	108	95	112	89	101	94
Vest- og Sydsjælland	101	101	101	95	93	93	92	98	99	93
Region Syddanmark	104	99	104	102	101	104	102	102	103	104
Fyn	107	108	110	106	106	107	105	102	111	104
Syddjylland	102	93	100	99	97	101	100	103	98	100
Region Midtjylland	91	93	92	95	93	93	91	92	91	90
Østjylland	91	92	91	96	95	94	92	95	92	93
Vestjylland	89	95	93	94	89	91	89	87	89	83
Region Nordjylland	89	94	92	101	103	98	96	94	92	92
Nordjylland	89	94	92	101	103	98	96	94	92	92

¹ Jf. note 1 i tabel 5 A.

² Jf. note 2 i tabel 6 A.

Tabel 8 B. Indeks for gennemsnitlig antal ambulante behandlinger fordelt efter regioner og landsdele¹. Kvinder. Sygdomsdiagnoser. 2012

	Alder									
	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
	kvinder hele landet = 100									
Hele landet	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Region Hovedstaden	113	112	107	104	106	103	105	108	107	113
Københavns by	113	113	102	107	105	100	109	115	109	116
Københavns omegn	122	121	117	106	111	112	101	103	110	115
Nordsjælland	102	105	104	100	101	100	102	101	105	110
Bornholm	89	74	73	85	94	97	90	83	86	97
Region Sjælland	102	101	105	101	96	97	92	96	99	97
Østsjælland	103	102	107	107	103	107	98	107	103	96
Vest- og Sydsjælland	101	101	105	99	94	94	91	92	98	97
Region Syddanmark	99	95	99	103	105	102	103	103	103	103
Fyn	97	97	103	112	110	109	112	111	108	104
Syddjylland	100	94	97	97	100	97	97	97	100	102
Region Midtjylland	88	93	92	91	91	94	95	94	90	88
Østjylland	88	93	93	93	90	92	93	94	92	90
Vestjylland	87	93	90	89	92	98	98	94	88	83
Region Nordjylland	93	92	90	102	99	107	98	91	94	88
Nordjylland	93	92	90	102	99	107	98	91	94	88

¹ Jf. note 1 i tabel 5 A.

² Jf. note 2 i tabel 6 A.

Tabel 8 A. (fortsat)

Alder								I alt ²	
50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
— mænd hele landet = 100 —									
100	100	100	100	100	100	100	100	100	Hele landet ²
112	113	116	113	113	111	116	118	112	Region Hovedstaden
117	119	126	128	124	127	125	129	118	Københavns by
113	114	114	111	112	108	114	120	111	Københavns omegn
107	105	110	105	105	102	110	103	106	Nordsjælland
90	90	93	78	91	97	97	91	89	Bornholm
97	99	96	99	96	96	91	91	97	Region Sjælland
91	98	100	104	100	95	103	107	100	Østsjælland
99	99	95	97	95	96	86	86	95	Vest- og Sydsjælland
103	102	102	104	106	107	111	109	104	Region Syddanmark
108	104	104	105	106	109	116	117	107	Fyn
100	100	100	103	105	105	108	103	102	Sydjylland
91	89	88	88	89	89	82	81	89	Region Midtjylland
95	94	92	90	92	91	85	84	92	Østjylland
83	80	81	83	84	85	77	76	84	Vestjylland
87	90	88	83	81	85	82	78	88	Region Nordjylland
87	90	88	83	81	85	82	78	88	Nordjylland

Tabel 8 B. (fortsat)

Alder								I alt ²	
50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
— kvinder hele landet = 100 —									
100	100	100	100	100	100	100	100	100	Hele landet ²
113	112	113	111	115	113	112	114	111	Region Hovedstaden
117	113	123	118	123	122	124	122	115	Københavns by
117	115	117	114	118	116	112	117	114	Københavns omegn
107	107	101	103	108	104	98	99	104	Nordsjælland
93	113	84	85	79	87	80	76	88	Bornholm
98	98	99	97	98	96	93	89	97	Region Sjælland
102	104	101	102	98	96	102	97	101	Østsjælland
97	97	99	94	99	96	89	86	96	Vest- og Sydsjælland
104	102	101	102	103	102	109	103	103	Region Syddanmark
108	105	103	105	105	103	110	108	106	Fyn
102	101	100	100	101	102	108	99	100	Sydjylland
89	90	89	89	87	90	86	88	90	Region Midtjylland
90	89	91	91	90	93	92	92	91	Østjylland
86	91	83	86	82	84	77	80	87	Vestjylland
84	90	90	91	82	86	82	81	90	Region Nordjylland
84	90	90	91	82	86	82	81	90	Nordjylland

Tabel 9. Indeks for indlagte patienter fordelt efter familietype¹ og køn. Sygdomsdiagnoser. 2012

	Mænd					Kvinder				
	Enlig	Gift	Samlevende ²	Samboende ³	Alle	Enlig	Gift	Samlevende ²	Samboende ³	Alle
	— alle mænd = 100 —					— alle kvinder = 100 —				
I alt⁴	115	92	101	98	100	109	91	100	106	100
1-4 år	111	92	111	142	100	114	91	113	117	100
5-9 år	117	95	103	97	100	114	95	105	122	100
10-14 år	113	96	91	106	100	118	94	96	106	100
15-19 år	113	94	94	106	100	125	86	99	127	100
20-24 år	100	135	133	92	100	96	131	164	103	100
25-29 år	103	106	116	86	100	100	112	111	89	100
30-34 år	112	93	97	90	100	111	95	92	100	100
35-39 år	126	85	91	103	100	124	88	89	123	100
40-44 år	130	84	89	110	100	126	87	84	127	100
45-49 år	129	84	91	105	100	122	89	89	113	100
50-54 år	131	85	89	94	100	124	89	86	107	100
55-59 år	128	88	89	101	100	119	91	91	105	100
60-64 år	124	91	93	98	100	120	91	92	105	100
65-69 år	118	94	103	97	100	116	91	105	103	100
70-74 år	115	95	113	99	100	111	91	110	98	100
75-79 år	109	96	128	102	100	106	91	..	105	100
80-84 år	109	95	..	94	100	103	91	..	108	100
85+ år	104	96	..	101	100	101	94	..	106	100

¹ Familietype 1.1.2012. Personer, som lever i registreret partnerskab er medtaget i tabellen under "Gift".

² Samlevende par: 2 ugifte personer med fællesbørn.

³ Samboende par: 2 ugifte personer med mindre end 15 års aldersforskel.

⁴ Tallene er standardiserede, dvs. der er korrigeret for, at køn- og aldersfordelingen ikke er ens for de forskellige familietyper. Hermed er det muligt at sammenligne på tværs af grupperne. Indeks lig med 100 angiver gennemsnittet for hhv. mænd og kvinder i den givne aldersgruppe.

Tabel 10. Indeks for ambulante patienter fordelt efter familietype¹ og køn. Sygdomsdiagnoser. 2012

	Mænd					Kvinder				
	Enlig	Gift	Samlevende ²	Samboende ³	Alle	Enlig	Gift	Samlevende ²	Samboende ³	Alle
	— alle mænd = 100 —					— alle kvinder = 100 —				
I alt⁴	100	100	97	103	100	101	98	97	108	100
1-4 år	110	95	104	149	100	108	95	105	147	100
5-9 år	107	98	100	109	100	105	98	99	113	100
10-14 år	104	99	96	106	100	104	99	96	102	100
15-19 år	100	101	97	97	100	102	98	97	110	100
20-24 år	99	98	109	104	100	96	116	130	110	100
25-29 år	97	107	102	103	100	92	111	106	105	100
30-34 år	100	100	94	105	100	98	100	92	113	100
35-39 år	105	97	91	108	100	107	95	92	125	100
40-44 år	107	96	97	108	100	109	96	92	114	100
45-49 år	105	97	95	105	100	106	97	92	108	100
50-54 år	105	98	95	100	100	105	98	95	104	100
55-59 år	103	99	96	100	100	104	98	94	102	100
60-64 år	99	101	92	101	100	103	99	91	101	100
65-69 år	97	101	98	100	100	102	99	102	103	100
70-74 år	96	101	104	101	100	101	99	100	100	100
75-79 år	94	103	101	101	100	100	100	93	107	100
80-84 år	93	104	109	104	100	99	103	..	105	100
85+ år	92	109	..	107	100	98	114	..	114	100

¹ Jf. note 1 i tabel 9.

² Jf. note 2 i tabel 9.

³ Jf. note 3 i tabel 9.

⁴ Jf. note 4 i tabel 9.

Tabel 11. Indeks for gennemsnitlig sengedagsforbrug fordelt efter familietype¹ og køn. Sygdomsdiagnoser. 2012

	Mænd					Kvinder				
	Enlig	Gift	Samle- vende ²	Sambo- ende ³	I alt	Enlig	Gift	Samle- vende ²	Sambo- ende ³	I alt
	alle mænd = 100					alle kvinder = 100				
I alt⁴	114	92	94	94	100	106	92	99	102	100
1-4 år	105	98	99	138	100	112	96	99	168	100
5-9 år	104	100	93	90	100	98	97	114	120	100
10-14 år	103	100	90	102	100	102	100	98	87	100
15-19 år	102	102	96	76	100	99	100	110	98	100
20-24 år	103	80	70	85	100	103	102	101	90	100
25-29 år	105	85	111	88	100	108	92	88	96	100
30-34 år	118	88	85	83	100	112	93	89	104	100
35-39 år	124	83	89	86	100	111	92	92	115	100
40-44 år	118	86	85	107	100	110	93	92	112	100
45-49 år	124	83	86	87	100	113	91	104	102	100
50-54 år	123	85	87	85	100	116	88	108	106	100
55-59 år	121	88	95	90	100	114	90	123	107	100
60-64 år	126	87	88	96	100	115	91	96	100	100
65-69 år	124	90	94	96	100	114	90	104	103	100
70-74 år	114	94	106	104	100	109	92	95	104	100
75-79 år	108	96	125	101	100	104	94	..	104	100
80-84 år	106	96	..	91	100	102	95	..	95	100
85+ år	101	98	..	114	100	100	99	..	80	100

¹ Jf. note 1 i tabel 9.

² Jf. note 2 i tabel 9.

³ Jf. note 3 i tabel 9.

⁴ Jf. note 4 i tabel 9.

Tabel 12. Indeks for gennemsnitlig antal ambulante behandlinger fordelt efter familietype¹ og køn. Sygdomsdiagnoser. 2012

	Mænd					Kvinder				
	Enlig	Gift	Samle- vende ²	Sambo- ende ³	I alt	Enlig	Gift	Samle- vende ²	Sambo- ende ³	I alt
	alle mænd = 100					alle kvinder = 100				
I alt⁴	106	97	97	97	100	103	98	93	106	100
1-4 år	102	99	101	81	100	104	99	101	95	100
5-9 år	100	100	99	89	100	99	100	104	99	100
10-14 år	105	100	93	93	100	102	100	98	94	100
15-19 år	101	100	102	96	100	101	100	99	99	100
20-24 år	100	117	93	97	100	99	124	87	104	100
25-29 år	102	99	98	97	100	97	105	82	108	100
30-34 år	107	97	93	96	100	100	98	83	122	100
35-39 år	113	93	92	97	100	105	95	88	131	100
40-44 år	115	93	92	97	100	106	96	94	111	100
45-49 år	112	93	91	101	100	105	97	100	98	100
50-54 år	112	94	95	96	100	107	97	98	96	100
55-59 år	112	94	98	101	100	107	97	102	99	100
60-64 år	112	96	105	95	100	107	97	94	99	100
65-69 år	107	98	101	96	100	104	98	120	100	100
70-74 år	104	98	111	101	100	106	96	88	100	100
75-79 år	102	99	117	99	100	100	100	109	100	100
80-84 år	98	101	118	98	100	100	101	..	107	100
85+ år	98	102	..	95	100	99	108	..	99	100

¹ Jf. note 1 i tabel 9.

² Jf. note 2 i tabel 9.

³ Jf. note 3 i tabel 9.

⁴ Jf. note 4 i tabel 9.

Tabel 13 A. Indeks for indlagte patienter fordelt efter socioøkonomisk status¹. Mænd. Sygdomsdiagnoser. 2012

	Alder									I alt ²
	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
	mænd i arbejdsstyrken = 100									
Mænd i arbejdsstyrken	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Selvstændig	106	83	98	94	97	96	97	97	101	97
Medarbejdende ægtefælle
Topledere	..	75	79	86	77	75	81	78	90	81
Lønmodt. højeste niveau	68	59	74	71	69	74	78	79	89	76
Lønmodt. mellemniveau	90	76	87	85	90	88	88	93	96	89
Lønmodt. grundniveau	99	108	107	110	108	108	101	102	98	104
Øvrige lønmodtagere	104	108	111	116	115	112	112	110	109	111
Arbejdsløse	..	110	133	136	135	124	131	128	111	126
Midlertidigt ude af arbejdsstyrken	159	174	209	229	241	245	246	225	167	213
Uddannelsessøgende	84	79	94	87	83
Pensionister mv.	255	266	279	294	296	288	261	240	169	217
Kontanthjælpsmodtagere	202	223	227	280	272	271	254	233	205	244
Øvrige uden for arbejdsstyrken	124	94	96	119	142	133	138	134	121	122

¹ Socioøkonomisk status i væsentligste beskæftigelse i 2011.

² Indeks angiver hvor stor en andel af en given befolkningsgruppe, der har været indlagt på sygehus. Tallene er standardiserede, dvs. der er korrigeret for, at køn- og aldersfordelingen ikke er ens for de forskellige socioøkonomiske grupper. Hermed er det muligt at sammenligne på tværs af grupperne. Indeks lig med 100 angiver gennemsnittet for hhv. mænd og kvinder i arbejdsstyrken i den givne aldersgruppe.

Tabel 13 B. Indeks for indlagte patienter fordelt efter socioøkonomisk status¹. Kvinder. Sygdomsdiagnoser. 2012

	Alder									I alt ²
	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
	kvinder i arbejdsstyrken = 100									
Kvinder i arbejdsstyrken	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Selvstændig	..	93	97	94	94	90	94	91	103	94
Medarbejdende ægtefælle	77	86	87	91	87
Topledere	..	90	79	84	77	82	89	88	81	83
Lønmodt. højeste niveau	80	70	76	76	77	80	82	86	89	80
Lønmodt. mellemniveau	105	93	94	91	93	91	93	94	96	93
Lønmodt. grundniveau	101	110	111	114	106	108	104	103	102	106
Øvrige lønmodtagere	91	89	109	107	113	112	110	110	106	106
Arbejdsløse	..	131	118	118	130	112	107	112	111	117
Midlertidigt ude af arbejdsstyrken	171	143	142	161	187	192	194	194	165	167
Uddannelsessøgende	89	82	94	101	89	97	88
Pensionister mv.	285	277	284	279	266	250	243	231	170	210
Kontanthjælpsmodtagere	247	229	215	219	225	231	221	201	200	225
Øvrige uden for arbejdsstyrken	115	73	80	111	130	132	124	142	111	112

¹ Jf. note 1 i tabel 13 A.

² Jf. note 2 i tabel 13 A.

Tabel 14 A. Indeks for ambulante patienter fordelt efter socioøkonomisk status¹. Mænd. Sygdomsdiagnoser. 2012

	Alder									I alt ²
	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
	mænd i arbejdsstyrken = 100									
Mænd i arbejdsstyrken	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Selvstændig	107	92	90	92	96	96	95	96	98	96
Medarbejdende ægtefælle	94
Topledere	86	86	81	84	86	85	87	88	96	87
Lønmodt. højeste niveau	81	85	87	86	83	85	88	91	96	88
Lønmodt. mellemniveau	97	95	96	96	99	97	97	99	99	98
Lønmodt. grundniveau	102	104	106	107	106	105	103	101	99	103
Øvrige lønmodtagere	95	96	101	103	104	105	104	103	103	102
Arbejdsløse	113	104	103	108	104	106	102	103	102	104
Midlertidigt ude af arbejdsstyrken	149	168	181	196	201	204	201	176	140	180
Uddannelsessøgende	90	89	90	87	97	103	90
Pensionister mv.	215	187	179	181	178	170	163	154	130	149
Kontanthjælpsmodtagere	139	141	155	171	168	162	158	143	126	154
Øvrige uden for arbejdsstyrken	90	65	69	87	101	98	106	109	101	92

¹ Jf. note 1 i tabel 13 A.

² Indeks angiver hvor stor en andel af en given befolkningsgruppe, der har modtaget ambulant behandling på sygehus. Tallene er standardiserede, dvs. der er korrigeret for, at køn- og aldersfordelingen ikke er ens for de forskellige socioøkonomiske grupper. Hermed er det muligt at sammenligne på tværs af grupperne. Indeks lig med 100 angiver gennemsnittet for hhv. mænd og kvinder i arbejdsstyrken i den givne aldersgruppe.

Tabel 14 B. Indeks for ambulante patienter fordelt efter socioøkonomisk status¹. Kvinder. Sygdomsdiagnoser. 2012

	Alder									I alt ²
	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
	kvinder i arbejdsstyrken = 100									
Kvinder i arbejdsstyrken	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Selvstændig	106	95	95	93	92	90	91	93	98	93
Medarbejdende ægtefælle	80	85	89	98	100	86	91
Topledere	89	90	87	78	80	80	88	85	90	84
Lønmodt. højeste niveau	85	87	89	90	87	87	91	94	100	91
Lønmodt. mellemniveau	103	105	104	100	100	99	99	101	102	101
Lønmodt. grundniveau	102	102	102	102	102	102	100	100	98	101
Øvrige lønmodtagere	91	89	98	103	107	108	106	102	100	102
Arbejdsløse	116	107	99	102	102	101	99	97	95	100
Midlertidigt ude af arbejdsstyrken	157	120	122	140	160	166	164	158	142	143
Uddannelsessøgende	94	88	92	91	97	87	80	92
Pensionister mv.	215	179	175	176	174	168	160	154	130	148
Kontanthjælpsmodtagere	154	138	146	151	159	156	150	143	143	150
Øvrige uden for arbejdsstyrken	93	55	69	97	105	111	110	109	101	93

¹ Jf. note 1 i tabel 13 A.

² Jf. note 2 i tabel 14 A.

Tabel 15. Indeks for indlagte børn¹ fordelt efter familiens socioøkonomisk status² og køn. Sygdomsdiagnoser. 2012

	Drenge					Piger				
	Alder				I alt ³	Alder				I alt ³
	1-4	5-9	10-14	15-18 ⁴		1-4	5-9	10-14	15-18 ⁴	
	alle drenge = 100					alle piger = 100				
I alt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Selvstændige	89	88	95	99	92	89	95	101	92	94
Medarbejdende ægtefæller
Topledere	86	99	93	87	91	85	97	96	81	89
Lønmodt. højeste niveau	88	90	96	89	90	85	91	89	79	86
Lønmodt. mellemniveau	95	97	98	95	96	94	95	92	97	95
Lønmodt. grundniveau	106	103	99	104	104	109	104	99	107	106
Øvrige lønmodtagere	103	101	99	101	101	104	104	109	105	105
Arbejdsløse	102	129	112	103	111	93	111	113	118	107
Midlertidigt ude af arbejdsstyrken	120	114	120	115	119	131	106	120	122	124
Uddannelsessøgende	102	116	107	89	111	95
Pensionister mv.	122	141	121	129	128	129	141	138	137	137
Kontanthjælpsmodtagere	139	123	132	134	134	142	117	133	140	135
Øvrige uden for arbejdsstyrken	98	124	91	118	106	95	111	91	100	99

¹ Tabellen omfatter kun hjemmeboende børn.

² Jf. note 1 i tabel 13 A.

³ Jf. note 2 i tabel 13 A.

⁴ Et barn er kun hjemmeboende til og med det 17. år. Da alderen i tabellen er opgjort 31.12.2012 vil nogle af de hjemmeboende børn imidlertid være fyldt 18 år.

Tabel 16. Indeks for børn¹ der modtager ambulantly behandling fordelt efter familiens socioøkonomiske status² og køn. Sygdomsdiagnoser. 2012

	Drenge					Piger				
	Alder				I alt ³	Alder				I alt ³
	1-4	5-9	10-14	15-18 ⁴		1-4	5-9	10-14	15-18 ⁴	
	alle drenge = 100					alle piger = 100				
I alt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Selvstændige	91	88	98	97	94	95	92	97	93	94
Medarbejdende ægtefæller
Topledere	89	98	96	96	96	89	96	100	96	97
Lønmodt. højeste niveau	90	94	95	96	93	89	93	93	92	92
Lønmodt. mellemniveau	101	100	101	101	101	96	100	101	101	100
Lønmodt. grundniveau	104	103	101	102	102	108	103	101	105	104
Øvrige lønmodtagere	102	102	101	101	102	102	102	101	104	103
Arbejdsløse	96	101	98	94	97	97	103	95	96	98
Midlertidigt ude af arbejdsstyrken	115	111	102	101	109	116	106	105	99	108
Uddannelsessøgende	95	103	106	..	100	92	110	96	84	98
Pensionister mv.	141	125	125	114	122	143	135	130	107	120
Kontanthjælpsmodtagere	120	114	105	102	111	121	112	106	95	109
Øvrige uden for arbejdsstyrken	92	93	96	91	93	92	93	98	97	95

¹ Jf. note 1 i tabel 15.

² Jf. note 1 i tabel 13 A.

³ Jf. note 2 i tabel 14 A.

⁴ Jf. note 4 i tabel 15.

Tabel 17 A. Indeks for gennemsnitlig sengedagsforbrug fordelt efter socioøkonomisk status¹. Mænd. Sygdomsdiagnoser. 2012

	Alder									I alt ²
	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
	mænd i arbejdsstyrken = 100									
Mænd i arbejdsstyrken	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Selvstændige	89	106	98	105	98	104	90	95	102	98
Medarbejdende ægtefæller
Topledere	..	81	70	75	91	99	82	98	91	91
Lønmodtagere på højeste niveau	82	105	104	89	93	104	96	91	100	97
Lønmodt. mellemniveau	76	104	107	93	98	93	85	96	98	95
Lønmodt. grundniveau	102	94	98	100	101	94	99	97	98	98
Øvrige lønmodtagere	100	104	96	111	102	96	111	108	101	104
Arbejdsløse	..	116	98	101	115	105	119	99	105	106
Midlertidigt ude af arbejdsstyrken	131	121	121	120	116	172	126	129	120	130
Uddannelsessøgende	113	114	148	105	116
Pensionister mv.	263	197	194	190	192	183	182	168	144	163
Kontanthjælpsmodtagere	129	121	134	136	150	161	163	152	145	147
Øvrige uden for arbejdsstyrken	105	109	146	112	120	153	126	127	129	125

¹ Jf. note 1 i tabel 13 A.

² Jf. note 2 i tabel 13 A.

Tabel 17 B. Indeks for gennemsnitlig sengedagsforbrug fordelt efter socioøkonomisk status¹. Kvinder. Sygdomsdiagnoser. 2012

	Alder									I alt ²
	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
	kvinder i arbejdsstyrken = 100									
Kvinder i arbejdsstyrken	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Selvstændige	..	73	85	101	92	97	103	101	111	100
Medarbejdende ægtefæller	77	105	83	89	88
Topledere	..	112	81	92	87	115	87	78	75	90
Lønmodtagere på højeste niveau	92	87	90	101	99	100	102	97	98	98
Lønmodt. mellemniveau	89	90	99	100	100	92	98	99	97	97
Lønmodt. grundniveau	98	105	102	99	98	99	96	101	101	99
Øvrige lønmodtagere	99	100	106	93	105	104	100	100	97	101
Arbejdsløse	..	88	87	93	91	115	125	100	95	101
Midlertidigt ude af arbejdsstyrken	150	120	117	123	116	128	141	132	147	128
Uddannelsessøgende	114	113	92	83	75	116	110
Pensionister mv.	258	202	195	189	202	175	171	160	146	161
Kontanthjælpsmodtagere	123	126	115	111	133	128	131	113	154	124
Øvrige uden for arbejdsstyrken	129	115	102	110	130	138	110	111	120	119

¹ Jf. note 1 i tabel 13 A.

² Jf. note 2 i tabel 13 A.

Tabel 18 A. Indeks for gennemsnitlig antal ambulante behandlinger fordelt efter socioøkonomisk status¹. Mænd. Sygdomsdiagnoser. 2012

	Alder									I alt ²
	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
	alle mænd i arbejdsstyrken = 100									
Mænd i arbejdsstyrken	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Selvstændige	97	96	94	95	101	100	96	97	99	98
Medarbejdende ægtefæller	102
Topledere	93	95	98	95	88	91	95	95	100	95
Lønmodtagere på højeste niveau	106	99	100	97	93	94	98	97	99	97
Lønmodt. mellemniveau	104	107	100	98	97	96	93	101	101	99
Lønmodt. grundniveau	99	97	98	98	99	99	98	96	97	98
Øvrige lønmodtagere	99	98	99	107	106	102	105	104	102	103
Arbejdsløse	103	97	100	99	103	109	114	104	97	104
Midlertidigt ude af arbejdsstyrken	116	132	139	125	135	147	130	132	121	132
Uddannelsessøgende	106	100	106	105	85	151	104
Pensionister mv.	143	143	148	169	187	171	154	152	130	146
Kontanthjælpsmodtagere	112	114	116	127	125	125	123	128	117	122
Øvrige uden for arbejdsstyrken	103	108	107	107	115	116	140	121	119	116

¹ Jf. note 1 i tabel 13 A.

² Jf. note 2 i tabel 14 A.

Tabel 18 B. Indeks for gennemsnitlig antal ambulante behandlinger fordelt efter socioøkonomisk status¹. Kvinder. Sygdomsdiagnoser. 2012

	Alder									I alt ²
	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
	alle kvinder i arbejdsstyrken = 100									
Kvinder i arbejdsstyrken	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Selvstændige	85	89	96	95	92	97	93	100	98	96
Medarbejdende ægtefæller	107	77	92	113	88	109	98
Topledere	91	139	96	96	99	104	102	101	101	102
Lønmodtagere på højeste niveau	101	102	99	99	99	104	99	98	96	99
Lønmodt. mellemniveau	111	102	99	100	99	96	101	100	98	99
Lønmodt. grundniveau	100	98	99	99	99	97	97	99	101	99
Øvrige lønmodtagere	96	96	104	103	102	104	102	102	102	102
Arbejdsløse	92	86	94	100	102	98	109	98	102	100
Midlertidigt ude af arbejdsstyrken	115	108	110	108	123	131	116	121	119	116
Uddannelsessøgende	103	97	93	95	109	94	90	100
Pensionister mv.	147	140	137	143	163	146	141	138	123	134
Kontanthjælpsmodtagere	108	104	105	106	110	119	115	123	119	110
Øvrige uden for arbejdsstyrken	109	104	96	113	116	124	114	118	105	111

¹ Jf. note 1 i tabel 13 A.

² Jf. note 2 i tabel 14 A.

Tabel 19 A. Indeks for indlagte patienter fordelt efter uddannelse¹. Mænd. Sygdomsdiagnoser. 2012

	Alder									I alt ²
	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
	— alle mænd = 100 —									
I alt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Grundskole eller uoplyst	145	141	143	151	144	142	133	122	117	134
Almengymnasial uddannelse	79	88	91	83	81	93	85	96	98	87
Erhvervsfaglig grundforløb	108	106	101	103	102	97	97	100	100	101
Kort videregående uddannelse	64	77	88	78	77	79	83	94	97	84
Mellemlang videregående udd.	68	74	75	73	74	73	76	80	86	78
Bachelor	69	75	72	75	59	58	77	70	71	70
Lang videregående uddannelse	44	55	64	60	60	60	63	64	77	64

¹ Højeste igangværende eller afsluttede uddannelse 1.1.2012.

² Indeks angiver hvor stor en andel af en given befolkningsgruppe, der har været indlagt på sygehus. Tallene er standardiserede, dvs. der er korrigeret for, at køn- og aldersfordelingen ikke er ens for de forskellige uddannelsesniveauer. Hermed er det muligt at sammenligne på tværs af grupperne. Indeks lig med 100 angiver gennemsnittet for hhv. mænd og kvinder i den givne aldersgruppe.

Tabel 19 B. Indeks for indlagte patienter fordelt efter uddannelse¹. Kvinder. Sygdomsdiagnoser. 2012

	Alder									I alt ²
	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
	— alle kvinder = 100 —									
I alt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Grundskole eller uoplyst	160	145	140	150	151	143	132	118	119	134
Almengymnasial uddannelse	83	105	109	91	81	83	83	91	91	87
Erhvervsfaglig grundforløb	122	118	113	110	104	100	97	100	97	104
Kort videregående uddannelse	69	87	78	82	83	87	77	77	85	81
Mellemlang videregående udd.	83	85	89	86	87	86	86	87	87	86
Bachelor	56	71	73	76	66	64	82	85	87	65
Lang videregående uddannelse	47	57	65	65	64	63	70	74	75	65

¹ Jf. note 1 i tabel 19 A.

² Jf. note 2 i tabel 19 A.

Tabel 20 A. Indeks for ambulante patienter fordelt efter uddannelse¹. Mænd. Sygdomsdiagnoser. 2012

	Alder									I alt ²
	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
	— alle mænd = 100 —									
I alt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Grundskole eller uoplyst	112	108	112	117	116	114	111	107	104	110
Almengymnasial uddannelse	91	91	90	93	91	91	90	94	93	92
Erhvervsfaglig grundforløb	107	107	105	105	104	101	101	101	102	103
Kort videregående uddannelse	87	93	92	90	93	97	98	100	100	95
Mellemlang videregående udd.	92	99	96	91	90	91	91	95	98	94
Bachelor	87	89	84	81	79	77	77	91	86	85
Lang videregående uddannelse	72	81	82	79	77	78	80	82	88	81

¹ Jf. note 1 i tabel 19 A.

² Indeks angiver hvor stor en andel af en given befolkningsgruppe, der har modtaget ambulant behandling på sygehus. Tallene er standardiserede, dvs. der er korrigeret for, at køn- og aldersfordelingen ikke er ens for de forskellige uddannelsesniveauer. Hermed er det muligt at sammenligne på tværs af grupperne. Indeks lig med 100 angiver gennemsnittet for hhv. mænd og kvinder i den givne aldersgruppe.

Tabel 20 B. Indeks for ambulante patienter fordelt efter uddannelse¹. Kvinder. Sygdomsdiagnoser. 2012

	Alder									I alt ²
	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
	— alle kvinder = 100 —									
I alt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Grundskole eller uoplyst	119	105	106	118	119	118	112	106	105	111
Almengymnasial uddannelse	88	93	97	93	90	87	87	88	93	90
Erhvervsfaglig grundforløb	116	115	109	105	103	102	100	100	99	103
Kort videregående uddannelse	83	96	95	90	92	95	91	87	93	91
Mellemlang videregående udd.	103	104	102	99	98	97	97	99	99	99
Bachelor	81	83	87	84	81	78	81	80	88	82
Lang videregående uddannelse	73	78	82	82	77	77	82	87	91	81

¹ Jf. note 1 i tabel 19 A.

² Jf. note 2 i tabel 20 A.

Tabel 21 A. Indeks for indlagte patienter fordelt efter familiens uddannelse¹. Drengene². Sygdomsdiagnoser. 2012

	Alder				I alt ³
	1-4	5-9	10-14	15-18 ⁴	
	— alle drenge = 100 —				
I alt	100	100	100	100	100
Grundskole eller uoplyst	123	119	109	120	119
Almengymnasial uddannelse	106	107	108	96	105
Erhvervsfaglig grundforløb	108	103	102	105	105
Kort videregående uddannelse	93	86	94	90	91
Mellemlang videregående uddannelse	93	97	97	91	95
Bachelor	90	98	79	76	89
Lang videregående uddannelse	87	92	97	91	90

¹ Højeste igangværende eller afsluttede uddannelse 1.1.2012. Familiens uddannelse er defineret som uddannelsen for den person i familien, der har den højeste uddannelse.

² Jf. note 1 i tabel 15.

³ Indeks angiver hvor stor en andel af en given befolkningsgruppe, der har været indlagt på sygehus. Tallene er standardiserede, dvs. der er korrigeret for, at køn- og aldersfordelingen ikke er ens for de forskellige uddannelsesniveauer hos familien. Hermed er det muligt at sammenligne på tværs af grupperne. Indeks lig med 100 angiver gennemsnittet for hhv. mænd og kvinder i den givne aldersgruppe.

⁴ Jf. note 4 i tabel 15.

Tabel 21 B. Indeks for indlagte patienter fordelt efter familiens uddannelse¹. Piger². Sygdomsdiagnoser. 2012

	Alder				I alt ³
	1-4	5-9	10-14	15-18 ⁴	
	— alle piger = 100 —				
I alt	100	100	100	100	100
Grundskole eller uoplyst	125	116	120	131	124
Almengymnasial uddannelse	104	110	97	89	101
Erhvervsfaglig grundforløb	108	104	106	108	107
Kort videregående uddannelse	92	93	94	96	94
Mellemlang videregående uddannelse	93	98	93	89	93
Bachelor	90	85	77	83	86
Lang videregående uddannelse	86	91	90	72	85

¹ Jf. note 2 i tabel 21 A.

² Jf. note 1 i tabel 15.

³ Jf. note 3 i tabel 21 A.

⁴ Jf. note 4 i tabel 15.

**Tabel 22 A. Indeks for ambulante patienter fordelt efter familiens uddannelse¹. Drengene²
Sygdomsdiagnoser. 2012**

	Alder				I alt ³
	1-4	5-9	10-14	15-18 ⁴	
	— alle drenge = 100 —				
I alt	100	100	100	100	100
Grundskole eller uoplyst	110	105	102	100	104
Almengymnasial uddannelse	94	103	94	87	95
Erhvervsfaglig grundforløb	108	104	103	102	104
Kort videregående uddannelse	101	100	100	99	100
Mellemlang videregående uddannelse	98	102	101	101	101
Bachelor	94	90	88	101	93
Lang videregående uddannelse	88	89	92	95	90

¹ Jf. note 2 i tabel 21 A.

² Jf. note 1 i tabel 15.

³ Indeks angiver hvor stor en andel af en given befolkningsgruppe, der har modtaget ambulante behandling på sygehus. Tallene er standardiserede, dvs. der er korrigeret for, at køn- og aldersfordelingen ikke er ens for de forskellige uddannelsesniveauer hos familien. Hermed er det muligt at sammenligne på tværs af grupperne. Indeks lig med 100 angiver gennemsnittet for hhv. mænd og kvinder i den givne aldersgruppe.

⁴ Jf. note 4 i tabel 15.

**Tabel 22 B. Indeks for ambulante patienter fordelt efter familiens uddannelse¹. Piger²
Sygdomsdiagnoser. 2012**

	Alder				I alt ³
	1-4	5-9	10-14	15-18 ⁴	
	— alle piger = 100 —				
I alt	100	100	100	100	100
Grundskole eller uoplyst	110	103	105	100	104
Almengymnasial uddannelse	93	93	97	89	93
Erhvervsfaglig grundforløb	106	105	103	105	105
Kort videregående uddannelse	101	100	98	101	100
Mellemlang videregående uddannelse	100	102	100	100	100
Bachelor	93	98	99	92	96
Lang videregående uddannelse	88	89	91	86	89

¹ Jf. note 2 i tabel 21 A.

² Jf. note 1 i tabel 15.

³ Jf. note 3 i tabel 22 A.

⁴ Jf. note 4 i tabel 15.

Tabel 23 A.

**Indeks for gennemsnitlig sengedagsforbrug fordelt efter uddannelse¹. Mænd
Sygdomsdiagnoser. 2012**

	Alder									I alt ²
	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
	— alle mænd = 100 —									
Mænd i alt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Grundskole eller uoplyst	114	109	107	124	110	112	111	108	109	111
Almengymnasial uddannelse	94	104	110	105	97	100	103	110	95	101
Erhvervsfaglig grundforløb	95	94	97	90	99	94	96	100	99	97
Kort videregående uddannelse	91	108	96	87	89	88	90	81	86	88
Mellemlang videregående uddannelse	88	102	85	91	89	98	76	86	91	89
Bachelor	90	93	106	83	118	108	134	113	109	101
Lang videregående uddannelse	73	81	95	74	80	86	93	83	91	86

¹ Jf. note 1 i tabel 19 A.² Jf. note 2 i tabel 19 A.

Tabel 23 B.

**Indeks for gennemsnitlig sengedagsforbrug fordelt efter uddannelse¹. Kvinder.
Sygdomsdiagnoser. 2012**

	Alder									I alt ²
	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
	— alle kvinder = 100 —									
Kvinder i alt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Grundskole eller uoplyst	113	113	116	110	121	117	114	112	107	112
Almengymnasial uddannelse	102	103	103	98	101	105	96	93	89	99
Erhvervsfaglig grundforløb	91	97	101	99	98	94	96	94	102	97
Kort videregående uddannelse	86	93	89	100	88	93	90	90	90	91
Mellemlang videregående uddannelse	91	93	91	96	85	91	90	93	88	90
Bachelor	92	86	108	86	88	111	86	76	75	91
Lang videregående uddannelse	131	91	83	91	85	87	88	88	93	89

¹ Jf. note 1 i tabel 19 A.² Jf. note 2 i tabel 19 A.

Tabel 24 A. Indeks for gennemsnitlig antal ambulante behandlinger fordelt efter uddannelse¹. Mænd. Sygdomsdiagnoser. 2012

	Alder									I alt ²
	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
	— alle mænd = 100 —									
Mænd i alt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Grundskole eller uoplyst	106	104	106	110	104	112	111	107	107	108
Almengymnasial uddannelse	95	98	99	100	106	99	101	101	106	100
Erhvervsfaglig grundforløb	98	96	98	99	101	98	98	99	99	99
Kort videregående uddannelse	98	98	98	94	98	93	90	89	97	94
Mellemlang videregående uddannelse	100	105	96	92	93	90	86	98	94	94
Bachelor	104	101	104	92	97	89	107	92	107	101
Lang videregående uddannelse	95	99	99	91	87	90	92	87	92	91

¹ Jf. note 1 i tabel 19 A.

² Jf. note 2 i tabel 20 A.

Tabel 24 B. Indeks for gennemsnitlig antal ambulante behandlinger fordelt efter uddannelse¹. Kvinder. Sygdomsdiagnoser. 2012

	Alder									I alt ²
	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
	— alle kvinder = 100 —									
Kvinder i alt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Grundskole eller uoplyst	106	102	101	107	109	106	106	105	105	105
Almengymnasial uddannelse	95	108	102	100	107	103	107	110	99	102
Erhvervsfaglig grundforløb	101	100	101	98	99	98	98	99	100	99
Kort videregående uddannelse	96	101	102	102	98	101	102	98	100	100
Mellemlang videregående uddannelse	102	100	97	98	94	96	96	95	93	96
Bachelor	97	99	98	98	97	100	104	85	92	97
Lang videregående uddannelse	104	95	101	99	95	101	93	94	97	97

¹ Jf. note 1 i tabel 19 A.

² Jf. note 2 i tabel 20 A.

Tabel 25. Indeks for indlagte patienter fordelt efter boligtype¹ og køn. Sygdomsdiagnoser. 2012

	Mænd					Kvinder				
	En-familie-huse	Række-, kæde- og dobbelt-huse	Etage-boliger	Øvrige bolig-typer	I alt	En-familie-huse	Række-, kæde- og dobbelt-huse	Etage-boliger	Øvrige bolig-typer	I alt
	— alle mænd = 100 —					— alle kvinder = 100 —				
I alt²	89	110	115	117	100	90	108	111	105	100
1-4 år	92	106	112	91	100	92	106	112	96	100
5-9 år	92	111	116	120	100	92	111	117	112	100
10-14 år	93	109	117	148	100	94	112	112	137	100
15-19 år	96	103	105	151	100	91	107	116	163	100
20-24 år	97	112	101	95	100	95	122	102	81	100
25-29 år	100	123	97	98	100	108	130	95	73	100
30-34 år	94	114	100	126	100	98	117	98	92	100
35-39 år	90	107	110	152	100	92	116	107	127	100
40-44 år	86	110	122	154	100	87	116	122	122	100
45-49 år	83	118	129	149	100	87	114	123	138	100
50-54 år	84	112	132	147	100	86	116	126	129	100
55-59 år	86	114	129	137	100	88	108	125	125	100
60-64 år	87	116	126	120	100	88	112	122	116	100
65-69 år	90	113	121	111	100	87	109	121	116	100
70-74 år	90	112	118	109	100	88	107	115	108	100
75-79 år	92	107	113	101	100	86	106	113	107	100
80-84 år	90	108	111	108	100	89	101	109	107	100
85+ år	93	102	108	99	100	95	96	105	92	100

¹ Boligtype 1.1.2012.

² Tallene er standardiserede, dvs. der er korrigeret for, at køn- og aldersfordelingen ikke er ens for de forskellige boligtyper. Hermed er det muligt at sammenligne på tværs af grupperne. Indeks lig med 100 angiver gennemsnittet for hhv. mænd og kvinder i den givne aldersgruppe.

Tabel 26. Indeks for ambulante patienter fordelt efter boligtype¹ og køn. Sygdomsdiagnoser. 2012

	Mænd					Kvinder				
	En-familie-huse	Række-, kæde- og dobbelt-huse	Etage-boliger	Øvrige bolig-typer	I alt	En-familie-huse	Række-, kæde- og dobbelt-huse	Etage-boliger	Øvrige bolig-typer	I alt
	— alle mænd = 100 —					— alle kvinder = 100 —				
I alt²	98	104	102	94	100	98	104	102	88	100
1-4 år	100	103	99	87	100	100	104	100	94	100
5-9 år	100	105	97	100	100	100	104	97	103	100
10-14 år	100	104	97	127	100	100	106	95	104	100
15-19 år	101	101	96	114	100	101	103	93	114	100
20-24 år	103	107	100	84	100	100	110	102	78	100
25-29 år	104	114	99	83	100	111	119	96	73	100
30-34 år	103	109	97	90	100	105	107	95	78	100
35-39 år	99	102	100	102	100	99	107	99	94	100
40-44 år	98	104	103	101	100	96	106	106	96	100
45-49 år	96	109	107	98	100	97	106	106	93	100
50-54 år	96	105	109	102	100	97	106	105	95	100
55-59 år	96	106	108	104	100	97	103	105	97	100
60-64 år	97	106	106	100	100	97	105	104	99	100
65-69 år	98	105	104	96	100	97	104	105	94	100
70-74 år	98	103	103	93	100	97	104	104	92	100
75-79 år	99	102	103	91	100	96	104	103	86	100
80-84 år	99	101	103	90	100	97	99	104	83	100
85+ år	101	97	103	77	100	103	96	103	69	100

¹ Jf. note 1 i tabel 25.

² Jf. note 2 i tabel 25.

Tabel 27. Indeks for gennemsnitlig sengedagsforbrug fordelt efter boligtype¹ og køn. Sygdomsdiagnoser. 2012

	Mænd					Kvinder				
	En-familie-huse	Række-, kæde- og dobbelt-huse	Etage-boliger	Øvrige bolig-typer	I alt	En-familie-huse	Række-, kæde- og dobbelt-huse	Etage-boliger	Øvrige bolig-typer	I alt
	alle mænd = 100					alle kvinder = 100				
I alt²	94	102	109	102	100	95	101	105	102	100
1-4 år	94	111	104	103	100	97	108	101	122	100
5-9 år	99	90	106	112	100	99	102	102	107	100
10-14 år	99	103	99	111	100	102	93	98	113	100
15-19 år	98	104	105	92	100	100	102	97	106	100
20-24 år	109	91	94	100	100	102	114	95	111	100
25-29 år	101	107	96	120	100	95	110	98	130	100
30-34 år	100	106	95	139	100	96	111	98	147	100
35-39 år	93	94	107	123	100	96	98	103	173	100
40-44 år	96	111	101	117	100	96	103	105	108	100
45-49 år	85	109	119	117	100	93	103	109	121	100
50-54 år	88	107	116	116	100	92	106	110	121	100
55-59 år	90	104	115	123	100	91	112	109	96	100
60-64 år	90	105	116	118	100	94	103	108	104	100
65-69 år	91	105	116	95	100	91	103	113	98	100
70-74 år	96	103	108	97	100	93	104	105	117	100
75-79 år	97	99	108	87	100	95	103	104	95	100
80-84 år	96	101	107	86	100	93	100	106	92	100
85+ år	101	98	102	79	100	102	94	104	74	100

¹ Jf. note 1 i tabel 25.

² Jf. note 2 i tabel 25.

Tabel 28. Indeks for gennemsnitlig antal ambulante behandlinger fordelt efter boligtype¹ og køn. Sygdomsdiagnoser. 2012

	Mænd					Kvinder				
	En-familie-huse	Række-, kæde- og dobbelt-huse	Etage-boliger	Øvrige bolig-typer	I alt	En-familie-huse	Række-, kæde- og dobbelt-huse	Etage-boliger	Øvrige bolig-typer	I alt
	alle mænd = 100					alle kvinder = 100				
I alt²	94	104	111	97	100	95	102	107	96	100
1-4 år	97	106	103	98	100	98	100	103	107	100
5-9 år	98	106	103	112	100	97	103	107	103	100
10-14 år	96	110	105	115	100	98	102	103	120	100
15-19 år	99	104	101	106	100	99	101	103	105	100
20-24 år	100	100	99	106	100	98	104	100	99	100
25-29 år	96	99	102	101	100	102	104	99	90	100
30-34 år	95	97	105	94	100	96	101	103	100	100
35-39 år	94	100	109	100	100	95	99	109	94	100
40-44 år	92	109	112	106	100	95	102	109	98	100
45-49 år	91	110	117	94	100	95	105	108	115	100
50-54 år	92	106	116	101	100	94	108	110	101	100
55-59 år	92	109	114	98	100	95	104	110	93	100
60-64 år	92	108	117	94	100	95	104	110	96	100
65-69 år	93	104	117	91	100	95	103	109	100	100
70-74 år	94	104	112	99	100	93	104	110	90	100
75-79 år	94	102	112	94	100	95	98	107	87	100
80-84 år	96	99	107	96	100	95	96	107	87	100
85+ år	99	93	107	86	100	99	96	104	74	100

¹ Jf. note 1 i tabel 25.

² Jf. note 2 i tabel 25.

Tabel 29. Indeks for indlagte patienter fordelt efter herkomst og køn. Sygdomsdiagnoser. 2012

	Mænd					Kvinder				
	Indvandrere		Efterkommere		Dansk oprindelse	Indvandrere		Efterkommere		Dansk oprindelse
	Vestlige lande	Ikke vestlige lande	Vestlige lande	Ikke vestlige lande		Vestlige lande	Ikke vestlige lande	Vestlige lande	Ikke vestlige lande	
	alle mænd = 100					alle kvinder = 100				
I alt¹	81	110	98	115	100	80	107	91	108	100
1-4 år	68	67	88	110	100	68	80	90	109	100
5-9 år	99	124	108	113	99	77	103	82	113	99
10-14 år	94	105	..	107	99	78	87	..	107	100
15-19 år	68	98	..	103	100	59	89	98	90	102
20-24 år	32	102	..	131	102	29	81	54	112	106
25-29 år	50	101	..	138	104	43	83	..	127	107
30-34 år	69	101	..	165	101	65	94	..	128	103
35-39 år	73	116	..	141	100	74	109	..	112	100
40-44 år	79	122	99	80	122	99
45-49 år	75	124	99	88	123	99
50-54 år	85	117	99	87	118	99
55-59 år	94	111	100	89	121	99
60-64 år	90	111	100	93	120	100
65-69 år	93	105	100	104	116	100
70-74 år	99	109	100	98	113	100
75-79 år	109	101	100	104	102	100
80-84 år	95	86	100	102	92	100
85+ år	111	75	100	103	86	100

¹ Tallene er standardiserede, dvs. der er korrigeret for, at køn- og aldersfordelingen ikke er ens for de forskellige herkomststyper. Hermed er det muligt at sammenligne på tværs af grupperne.

Tabel 30. Indeks for ambulante patienter fordelt efter herkomst og køn. Sygdomsdiagnoser. 2012

	Mænd					Kvinder				
	Indvandrere		Efterkommere		Dansk oprindelse	Indvandrere		Efterkommere		Dansk oprindelse
	Vestlige lande	Ikke vestlige lande	Vestlige lande	Ikke vestlige lande		Vestlige lande	Ikke vestlige lande	Vestlige lande	Ikke vestlige lande	
	alle mænd = 100					alle kvinder = 100				
I alt¹	76	107	95	102	100	79	101	91	95	101
1-4 år	60	80	89	104	100	66	74	92	107	100
5-9 år	80	94	74	100	100	70	82	81	105	100
10-14 år	73	93	107	95	101	76	75	102	91	101
15-19 år	63	90	96	96	101	56	75	78	80	103
20-24 år	28	88	76	113	105	33	74	68	90	107
25-29 år	47	89	97	116	106	47	73	78	98	109
30-34 år	57	93	91	114	104	65	90	99	108	104
35-39 år	67	107	83	106	101	79	106	98	101	100
40-44 år	73	115	98	87	100	83	115	95	97	99
45-49 år	78	123	98	..	99	85	121	89	..	99
50-54 år	85	121	98	..	99	85	116	93	..	99
55-59 år	90	117	117	..	99	90	113	97	..	100
60-64 år	90	111	88	..	100	93	109	102	..	100
65-69 år	95	105	123	..	100	98	103	92	..	100
70-74 år	102	102	113	..	100	101	96	97	..	100
75-79 år	102	92	100	103	84	109	..	100
80-84 år	102	84	100	99	78	100
85+ år	107	90	100	105	86	117	..	100

¹ Jf. note 1 i tabel 29.

Tabel 31. Indeks for gennemsnitlig sengedagsforbrug fordelt efter herkomst og køn. Sygdomsdiagnoser. 2012

	Mænd						Kvinder					
	Indvandrere		Efterkommere		Dansk oprindelse	I alt	Indvandrere		Efterkommere		Dansk oprindelse	I alt
	Vestlige lande	Ikke vestlige lande	Vestlige lande	Ikke vestlige lande			Vestlige lande	Ikke vestlige lande	Vestlige lande	Ikke vestlige lande		
	alle mænd = 100						alle kvinder = 100					
I alt¹	100	92	109	111	100	100	94	83	101	104	101	100
1-4 år	79	130	101	120	98	100	86	74	103	110	99	100
5-9 år	78	147	80	112	99	100	134	94	91	100	100	100
10-14 år	122	109	..	130	97	100	88	96	..	112	98	100
15-19 år	64	104	..	115	99	100	115	104	69	109	99	100
20-24 år	86	86	..	81	102	100	72	89	137	92	101	100
25-29 år	83	103	..	109	100	100	108	93	..	83	101	100
30-34 år	88	98	..	86	101	100	77	87	..	111	103	100
35-39 år	107	82	..	79	102	100	91	85	..	95	102	100
40-44 år	103	96	100	100	81	75	104	100
45-49 år	79	87	102	100	116	86	101	100
50-54 år	104	87	101	100	89	71	102	100
55-59 år	105	79	101	100	95	75	102	100
60-64 år	105	86	100	100	101	81	101	100
65-69 år	97	95	100	100	93	82	101	100
70-74 år	103	106	100	100	89	82	101	100
75-79 år	98	104	100	100	93	97	100	100
80-84 år	115	89	100	100	93	76	100	100
85+ år	105	105	100	100	99	96	100	100

¹ Jf. note 1 i tabel 29.

Tabel 32. Indeks for gennemsnitligt antal ambulante behandlinger fordelt efter herkomst og køn. Sygdomsdiagnoser. 2012

	Mænd						Kvinder					
	Indvandrere		Efterkommere		Dansk oprindelse	I alt	Indvandrere		Efterkommere		Dansk oprindelse	I alt
	Vestlige lande	Ikke vestlige lande	Vestlige lande	Ikke vestlige lande			Vestlige lande	Ikke vestlige lande	Vestlige lande	Ikke vestlige lande		
	alle mænd = 100						alle kvinder = 100					
I alt¹	99	112	96	115	99	100	99	106	105	108	100	100
1-4 år	109	108	102	109	99	100	82	91	95	109	99	100
5-9 år	92	132	89	120	98	100	137	123	83	111	99	100
10-14 år	89	135	106	122	98	100	97	100	90	109	99	100
15-19 år	91	109	93	107	99	100	88	107	101	111	99	100
20-24 år	97	99	79	115	99	100	96	98	115	100	100	100
25-29 år	92	103	85	101	100	100	92	102	100	111	100	100
30-34 år	90	107	96	120	99	100	98	101	97	104	100	100
35-39 år	86	109	90	132	99	100	99	106	107	106	99	100
40-44 år	91	109	95	98	99	100	89	103	92	97	100	100
45-49 år	93	113	88	..	99	100	92	104	112	..	100	100
50-54 år	97	111	90	..	99	100	95	102	118	..	100	100
55-59 år	104	105	100	..	100	100	102	106	115	..	100	100
60-64 år	101	118	112	..	99	100	103	116	121	..	99	100
65-69 år	99	122	72	..	99	100	107	113	115	..	100	100
70-74 år	103	122	113	..	99	100	96	108	90	..	100	100
75-79 år	114	122	99	100	103	120	129	..	100	100
80-84 år	93	107	100	100	105	127	100	100
85+ år	120	112	100	100	99	117	112	..	100	100

¹ Jf. note 1 i tabel 29.

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2013:9

Statistiske Efterretninger

ISSN, 1601-0973

www.dst.dk/efterretningerSalg: www.dst.dk/boghandel eller Tlf.: 43 22 73 00

Abonnement for 2013: 925 kr. som pdf.

Løssalg: 120 kr. + ekspeditionsgebyr

© Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø

Signaturforklaring:

- Nul

0 Mindre end 0,5 af den anvendte enhed

0,0 Mindre end 0,05 af den anvendte enhed

• Tal kan efter sagens natur ikke forekomme

.. For usikker til at kunne angives eller diskretionshensyn

... Oplysning foreligger ikke

* Foreløbige eller anslåede tal

— | Vandret eller lodret streg markerer databrud i en tidsserie.

Oplysningerne fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige.

Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen.